

# DIVERSIDADE REGIONAL

## O câncer na América Latina e no Caribe

O câncer de próstata é a principal causa de morte por câncer entre os homens, ao passo que o câncer de mama é a principal causa entre as mulheres. O câncer de pulmão também é uma causa significativa de morte em ambos os sexos.

① Estima-se que ocorram cerca de 1,1 milhão de novos casos de câncer e 600.000 mortes decorrentes do câncer na América Latina e no Caribe, anualmente. O câncer de próstata é a principal causa de morte por câncer entre os homens, com cerca de 51.000 mortes por ano, seguido pelo câncer de pulmão e pelo câncer de estômago. Entre as mulheres, o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer, com cerca de 43.000 mortes por ano, seguido pelo câncer de colo do útero e pelo câncer de pulmão.


Há considerável variação nas taxas e nas tendências de câncer na América Latina. Por exemplo, as taxas de incidência de câncer de colo do útero em 2012 variaram de 11,4 casos em 100.000 habitantes na Costa Rica a 47,7 casos em 100.000 habitantes na Bolívia, sendo que as taxas mais altas são encontradas geralmente nos países de baixa renda.

② As taxas de câncer de colo do útero estão caindo em muitos países devido ao maior rastreamento, ao passo que as taxas de câncer de mama estão aumentando devido à maior prevalência de fatores hormonais associados, como gravidez tardia e baixa paridade, assim como fatores de risco do estilo de vida. As taxas de câncer de vesícula biliar são excepcionalmente altas em muitos países da América Latina, especialmente no Chile e na Bolívia, por causas desconhecidas.

③ As taxas de mortalidade do câncer de pulmão começaram a se estabilizar ou cair entre os homens em muitos países de média renda das Américas, como Argentina e Brasil, por causa da diminuição da prevalência do tabagismo. Notavelmente, as taxas de mortalidade do câncer de pulmão entre mulheres continuam a aumentar na maioria dos países das Américas, refletindo a defasagem na redução do tabagismo.

## ② À medida que as taxas de câncer de colo do útero estão diminuindo, as taxas de câncer de mama estão aumentando.

TENDÊNCIAS NA INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA EM MULHERES, TAXAS PADRONIZADAS PELA IDADE\* (MUNDO), POR POPULAÇÃO DE 100.000, TODAS AS IDADES, TAXAS POR 100.000, 1981 A 2006





\*As taxas foram homogeneizadas usando-se médias de 3 anos.

### ①

## O câncer de pulmão também é a principal causa de morte em ambos os sexos combinados.

NÚMEROS ESTIMADOS DE NOVOS CASOS DE CÂNCER E DE MORTES, AMBOS OS SEXOS, 2012



**Taxas de mortalidade por câncer de vesícula biliar em ambos os sexos**

TAXA PADRONIZADA PELA IDADE, POR POPULAÇÃO DE 100.000 2012

0,6 ou menos

0,7 a 1,4

1,5 a 2,1

2,2 a 3,6

3,7 ou mais



As taxas de mortalidade do câncer de vesícula biliar são altas em muitos países da América Latina.

O Chile tem as taxas mais altas do mundo de câncer de vesícula biliar em mulheres.

3

**As taxas de mortalidade do câncer de pulmão têm, de modo geral, se estabilizado ou diminuído entre os homens, ao passo que continuam a aumentar entre as mulheres.**

