

Manifestações Oraís do Linfoma: Revisão Sistemática

Táisa Domingues Bernardes Silva¹; Camila Belo Tavares Ferreira¹; Gustavo Boehmer Leite²; José Roberto de Menezes Pontes¹; Héilton Spíndola Antunes¹

Resumo

Introdução: O linfoma é uma doença maligna e pode ser dividido em linfoma Hodgkin (LH) e linfoma não Hodgkin (LNH). O LNH é diagnosticado em sítios extranodais em 40% dos casos, sendo a região de cabeça e pescoço a segunda mais acometida com incidência de 11% a 33%, em contrapartida, o LH tem uma incidência muito baixa em sítios extranodais (1-4%). **Objetivo:** Sendo assim, o objetivo deste estudo foi identificar as manifestações orais do linfoma por meio de uma revisão sistemática de literatura. **Método:** As bases de dados utilizadas incluíram Pubmed, Lilacs, Embase e Cochrane Library. Foram selecionados 61 artigos dos 1.276 encontrados. **Resultados:** Entre os achados intraorais, os mais frequentes foram ulcerações, dor, aumentos de volume e mobilidade dentária. Já nos achados extraorais, destacaram-se assimetria facial e linfadenopatias, cervicais, submandibulares e submentuais. **Conclusão:** Poucos estudos relataram exames de imagem, porém as lesões hipodensas com limites difusos, reabsorções ósseas e deslocamentos dentários foram as mais citadas. As publicações estudadas apontam para a existência de lacunas quanto à detecção precoce, ao diagnóstico e ao tratamento adequado.

Palavras-chave: Linfoma; Linfoma não Hodgkin; Manifestações Buciais; Revisão

¹ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva

² Universidade Federal do Rio de Janeiro