



# ATLAS

de mortalidade  
por câncer  
no Brasil  
1979-1999



**ATLAS**  
de mortalidade  
por câncer  
no Brasil  
**1979-1999**

2002 – Ministério da Saúde

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, e mecânico, fotográfico e gravação ou qualquer outro, sem a permissão expressa do Instituto Nacional de Câncer/MS (lei nº 5.988 de 14.12.73).

Tiragem 1.000 exemplares

Edição e distribuição:

Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Coordenação de Prevenção e Vigilância – Conprev

Rua dos Inválidos, 212 - 2º, 3º e 4º andar

20231-020 – Rio de Janeiro – RJ

Tel: (0XX21) 3970 7400

Fax: (0XX21) 3970 7505

e-mail: [conprev@inca.gov.br](mailto:conprev@inca.gov.br)

Impresso no Brasil/Printed in Brazil

B823a

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância – Conprev.

Atlas de mortalidade por câncer no Brasil 1979-1999. - Rio de Janeiro: INCA, 2002.

412p. : il.

ISBN 85-7318-080-3

1. Neoplasias. 2. Mortalidade. 3. Brasil. I. Título.

CDD-616.994

Esta publicação é parte do convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o Instituto Nacional de Câncer – INCA, como Centro Colaborador do CENEPI – Centro Nacional de Epidemiologia/FUNASA/MS.

Os dados desta publicação também estarão disponíveis no site do INCA: <http://www.inca.gov.br>

# Apresentação

Um dos grandes avanços na saúde pública brasileira vem sendo o reconhecimento efetivo da importância da Vigilância à Saúde. A ação paciente, perseverante e contínua por deter informações de qualidade que possam ser utilizadas por todos os níveis de gestão do Sistema Único de Saúde – SUS está tomando seu lugar como atividade estratégica para servir de base para as propostas e experiências. É graças a este reconhecimento que, hoje é possível elaborar e publicar produtos nacionais tão necessários e esperados como o presente Atlas de Mortalidade.

Ciente da importância de contar com informações de excelência, o Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde, vem investindo, ao longo de quase dez anos, na estruturação e aprimoramento de sistemas de informação sobre neoplasias malignas – locais, regionais e de dimensão nacional. Em uma primeira fase, foram apoiados os registros de câncer existentes no Brasil, fornecendo cooperação técnica e financeira; e também estimulando a criação de mais registros. Depois, foi criada uma gerência específica de epidemiologia do câncer, responsável não somente pela produção de análises epidemiológicas úteis para o Instituto e para diversos Gestores do SUS, mas também por ações de Vigilância do Câncer e dos Comportamentos de Risco para Câncer; e recentemente, no final de 1999, iniciou-se a implementação do Programa de Epidemiologia e Vigilância do Câncer e dos Fatores de Risco de Câncer, que formalizou o trabalho de dimensão nacional que o INCA já vinha realizando com a maioria dos estados da União. As ações do INCA abrangem progressivamente várias das dimensões estratégicas da Vigilância do Câncer, primeiro e, recentemente, da Vigilância dos Comportamentos de Risco.

O Programa de Epidemiologia e Vigilância concentra esforços na constituição de redes comunicadas e produtivas de equipes técnicas estaduais capazes de realizar todas as ações da vigilância do câncer dos comportamentos de risco desta doença: desde a identificação das fontes de informação até a realização de análises e a interpretação das informações obtidas. Para isto, fornece cooperação técnica permanente – sob a forma de consultas à distância, visitas técnicas, e organização de cursos e encontros técnicos e gerenciais, e cooperação financeira para adquirir equipamentos de informática.

Dentro deste quadro favorável, o trabalho nacional do INCA tem sido importante exemplo de visão inovadora em Saúde Pública, por conceber a estruturação de um tipo diferente de vigilância à saúde: a vigilância das doenças crônicas em âmbito nacional – com sua especificidade, o câncer e os comportamentos de risco a ele associados. Em outras áreas do Ministério da Saúde esta atividade passou a ser considerada de importância nacional em 2000, com a criação da Gerência de Doenças e Agravos Não Transmissíveis – DANT, no Centro Nacional de Epidemiologia – CENEPI. A gerência do CENEPI vem impulsionando, desde então, a implantação de um Sistema Nacional de Vigilância de DANT, recebendo o apoio permanente do INCA e das Coordenações Estaduais do Programa de Epidemiologia e Vigilância de Câncer e dos Fatores de Risco de Câncer. Pela sua experiência e capacidade, o INCA foi convidado pelo CENEPI a trabalhar como Centro Colaborador para Informações sobre o Câncer, mediante convênio inter-institucional.

O presente Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil é um importante fruto de todos estes esforços e processos de estruturação da vigilância à saúde no Brasil. Se, por um lado, ele utiliza as consideradas excelentes informações do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM, do Ministério da Saúde, por outro lado é resultado de um processo de acúmulo de interesses, capacidades e habilidades técnicas e sanitárias do INCA, por meio da equipe da Divisão de Epidemiologia e Vigilância, da Coordenação de Prevenção e Vigilância – CONPREV. Espera-se que este Atlas sirva de exemplo para outras iniciativas – estaduais ou municipais, e para o aprofundamento neste campo recentemente abordado na epidemiologia do câncer no nosso país.

A incorporação da disposição espacial em Saúde Pública, ou espacialização, expressado no uso de técnicas de geoprocessamento de informações epidemiológicas, permite dimensionar de forma distinta – mais visual – os problemas de saúde - no presente trabalho, a magnitude da mortalidade produzida pelas principais neoplasias malignas no país, no período que vai de 1979 a 1999, a partir dados disponibilizados pelo SIM/MS. Hoje, podemos considerar consenso afirmar que visualizar a distribuição, comportamento e evolução das doenças ao longo do tempo constitui, de fato, um meio efetivo, rápida e de muita utilidade para conhecer as realidades sanitárias regionais e nacionais, e para priorizar e reorientar recursos para melhorar a saúde das “áreas problema” detectadas pelo processamento espacial das informações. Todavia, além dos benefícios no planejamento e na gestão global do sistema de saúde, o Atlas também pode ser parte dos mecanismos de negociação, estímulo à participação no nível local, e de solução de problemas de saúde, no SUS, inclusive de promoção à saúde, no âmbito do Programa de Saúde da Família – PSE, e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS.

Desta forma, a publicação das análises e produtos elaborados com cuidado e competência profissional que levaram à criação deste Atlas de Mortalidade, é muito bem-vinda. Esperamos que ele constitua o ponto de partida para um conjunto de novas publicações – do INCA ou dos seus parceiros estaduais e nacionais – e para uma linha de hipóteses e estudos que venha completar e melhorar a imagem, muito dinâmica, que temos sobre a morbidade e a mortalidade por câncer no Brasil.

*Jacob Kligerman*

Diretor Geral

Instituto Nacional de Câncer

Ministério da Saúde

# Sumário

• Apresentação	03
• Elaboração	09
• Introdução	11
• Metodologia	13
• Características Geográficas do Brasil	17
• Mortalidade Proporcional por câncer, não ajustada, em homens e mulheres, entre 1979 e 1999	19
• Distribuição proporcional do total de mortes por câncer, segundo localização primária do tumor, em homens e em mulheres, para os períodos entre 1979 e 1983 e entre 1995 e 1999.	23
Brasil .....	25
Acre .....	26
Alagoas .....	27
Amapá .....	28
Amazonas .....	29
Bahia .....	30
Ceará .....	31
Distrito Federal .....	32
Espírito Santo .....	33
Goiás .....	34
Maranhão .....	35
Mato Grosso .....	36
Mato Grosso do Sul .....	37
Minas Gerais .....	38
Pará .....	39
Paraíba .....	40
Paraná .....	41
Pernambuco .....	42
Piauí .....	43
Rio de Janeiro .....	44
Rio Grande do Norte .....	45
Rio Grande do Sul .....	46
Rondônia .....	47
Roraima .....	48
Santa Catarina .....	49
São Paulo .....	50
Sergipe .....	51
Tocantins .....	52
• Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983 e entre 1995 e 1999.	53
Brasil .....	55
Acre .....	56
Alagoas .....	57
Amapá .....	58
Amazonas .....	59

Bahia .....	60
Ceará .....	61
Distrito Federal .....	62
Espírito Santo .....	63
Goiás .....	64
Maranhão .....	65
Mato Grosso .....	66
Mato Grosso do Sul .....	67
Minas Gerais .....	68
Pará .....	69
Paraíba .....	70
Paraná .....	71
Pernambuco .....	72
Piauí .....	73
Rio de Janeiro .....	74
Rio Grande do Norte .....	75
Rio Grande do Sul .....	76
Rondônia .....	77
Roraima .....	78
Santa Catarina .....	79
São Paulo .....	80
Sergipe .....	81
Tocantins .....	82
• Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias de câncer mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população padrão mundial, <i>por 100.000 homens e por 100.000 mulheres</i> , entre 1979 e 1999.	83
Brasil .....	85
Acre .....	86
Alagoas .....	87
Amapá .....	88
Amazonas .....	89
Bahia .....	90
Ceará .....	91
Distrito Federal .....	92
Espírito Santo .....	93
Goiás .....	94
Maranhão .....	95
Mato Grosso .....	96
Mato Grosso do Sul .....	97
Minas Gerais .....	98
Pará .....	99
Paraíba .....	100
Paraná .....	101
Pernambuco .....	102
Piauí .....	103
Rio de Janeiro .....	104
Rio Grande do Norte .....	105
Rio Grande do Sul .....	106
Rondônia .....	107
Roraima .....	108
Santa Catarina .....	109
São Paulo .....	110
Sergipe .....	111
Tocantins .....	112

• Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, <i>por 100.000 homens e por 100.000 mulheres</i> , entre 1995 e 1999.	113
Neoplasias .....	115
Boca .....	116
Colo do Útero .....	117
Cólon e Reto .....	118
Encéfalo .....	119
Esôfago .....	120
Estômago .....	121
Fígado .....	122
Laringe .....	123
Leucemia .....	124
Mama .....	125
Pâncreas .....	126
Próstata .....	127
Pulmão .....	128
Tecido Linfático .....	129
Vesícula Biliar. ....	130
• Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por câncer, <i>por 100.000 homens e por 100.000 mulheres</i> , nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.	131
Neoplasias .....	132
Boca .....	134
Cólon e Reto .....	136
Encéfalo .....	138
Esôfago .....	140
Estômago .....	142
Fígado .....	144
Laringe .....	146
Leucemia .....	148
Mama .....	150
Colo do Útero .....	151
Pâncreas .....	152
Pulmão .....	154
Tecido Linfático .....	156
Vesícula Biliar .....	158
Próstata .....	160
• Número médio de anos potenciais de vida perdidos por câncer, por 1.000 habitantes, 1.000 homens e 1.000 mulheres, Brasil, entre 1995 e 1999.	161
Neoplasias .....	163
Boca .....	164
Estômago .....	165
Colo do Útero .....	166
Mama .....	166
Próstata .....	166
Pulmão .....	167



• Série temporal das taxas de mortalidade, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, para topografias selecionadas, entre 1979 e 1999.	169
Brasil .....	171
Acre .....	181
Alagoas .....	189
Amapá .....	197
Amazonas .....	205
Bahia .....	213
Ceará .....	221
Distrito Federal .....	229
Espírito Santo .....	237
Goiás .....	245
Maranhão .....	253
Mato Grosso .....	261
Mato Grosso do Sul .....	269
Minas Gerais .....	277
Pará .....	285
Paraíba .....	293
Paraná .....	301
Pernambuco .....	309
Piauí .....	317
Rio de Janeiro .....	325
Rio Grande do Norte .....	333
Rio Grande do Sul .....	341
Rondônia .....	349
Roraima .....	357
Santa Catarina .....	365
São Paulo .....	373
Sergipe .....	381
Tocantins .....	389
• Variação Percentual Anual Estimada (EAPC), por câncer, para o <i>sexo masculino</i> e para o <i>sexo feminino</i> , Brasil, entre 1979 e 1999.	397
Neoplasias .....	399
Boca .....	399
Colo do Útero .....	400
Cólon e Reto .....	400
Encéfalo .....	401
Esôfago .....	401
Estômago .....	402
Fígado .....	402
Laringe .....	403
Leucemia .....	403
Mama .....	404
Pâncreas .....	404
Próstata .....	405
Pulmão .....	405
Tecido Linfático .....	406
Vesícula Biliar. ....	406
• Bibliografia	409

## **Elaboração**

Adelemara Mattoso Allonzi

Ana Leticia Cunha Noia

Luís Felipe Leite Martins

Luiz Claudio Santos Thuler

Marceli de Oliveira Santos

Marcia Regina Dias Alves

Marise Souto Rebelo

Moyses Szklo

Rejane Goldfarb

Valeska Figueiredo

# Introdução

**N**os últimos tempos, sanitaristas e a comunidade científica de vários países têm observado com satisfação o desenvolvimento crescente de estudos relacionados com os aspectos geográficos do câncer, para os quais os Atlas de Mortalidade representam uma importante contribuição. A publicação do primeiro Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil representa um esforço fundamental do Instituto Nacional de Câncer / Ministério da Saúde, no sentido de fornecer dados aos profissionais envolvidos com a saúde de nosso povo, sobre a distribuição geográfica e temporal de taxas de mortalidade por enfermidades malignas. Mortalidade é, naturalmente, a taxa mais utilizada em estudos geográficos descritivos, pois, baseia-se em um documento oficial (declaração de óbito), para o qual existem normas para codificação comuns a todos os países (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde), visando à padronização da qualidade das informações e, conseqüentemente, a comparação de dados entre países e a consolidação de dados globais.

O Atlas tem como uma de suas finalidades principais auxiliar os profissionais da saúde pública na determinação de prioridades necessárias à prevenção e ao controle do câncer. Ao ilustrar as distribuições espacial e temporal de mortalidade, outro objetivo importante do Atlas é permitir o estudo da correlação da mortalidade por câncer com variáveis associadas a estilo de vida e a outras condições ambientais entre populações, da importância fundamental para a análise das características das diferentes regiões e unidades federativas brasileiras. Conseqüentemente, o Atlas também pode ser útil na identificação de fatores de riscos suspeitos, a serem explorados em estudos epidemiológicos analíticos.

Nesta publicação, são apresentadas informações sobre quinze neoplasias malignas selecionadas, a saber: câncer de boca, colo do útero, cólon e reto, encéfalo, esôfago, estômago, fígado, laringe, leucemias, mama feminina, pâncreas, próstata, traquéia, brônquios e pulmão, tecido linfático, vesícula biliar e vias extra-hepáticas, e todas as neoplasias consolidadas. As informações encontram-se distribuídas em termos nacionais e estaduais e são classificadas por sexo e por localização primária do tumor. As taxas de mortalidade são mostradas em forma bruta e ajustadas por idade pelos padrões populacionais mundial e brasileiro.

# Metodologia

## Fontes de Informação

• **Mortalidade** – A mortalidade é o tipo de taxa mais frequentemente utilizada para estudos geográficos. A taxa de mortalidade reflete o risco de morte em um dado período entre uma população específica. Os dados de mortalidade, obtidos através do recolhimento sistemático das informações dos atestados de óbito, são os mais simples e acessíveis para o estudo das condições de saúde de uma população.

Para esta publicação, os dados de óbito foram organizados por sexo, faixa etária, unidade da federação (local de residência) e causa de morte (neoplasia maligna segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID).

A fonte de dados de óbitos por câncer é o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Desde sua criação, em 1975, as informações contidas nas declarações de óbito passaram a ser codificadas, tabuladas e divulgadas em anuários estatísticos desse Ministério, de acordo com a Nona Edição da CID. Em 1996, passou-se a utilizar a tradução da CID-10 em língua portuguesa para classificar os dados de mortalidade. Portanto, neste Atlas de Mortalidade por Câncer, os dados do SIM de 1979 a 1995 são classificados pela CID-9, enquanto que, para o período entre 1996 e 1999, pela CID-10. Para permitir a comparabilidade entre os dados apresentados, foram utilizados os critérios de conversão entre essas duas edições da CID, preconizados internacionalmente.

Para esta publicação foram selecionadas as seguintes neoplasias malignas:

CID-9	CID-10	Neoplasia maligna de
140-146	C00-C10	Boca
150	C15	Esôfago
151	C16	Estômago
153-154	C19-C21	Cólon e Reto
155	C22	Fígado e vias biliares intrahepáticas
157	C25	Pâncreas
161	C32	Laringe
162	C33-C34	Traquéia, brônquios e pulmão
174	C50	Mama
180	C53	Colo do útero
185	C61	Próstata
191	C71	Encéfalo
200-202	C81-C85	Tecido linfático
204-208	C91-C95	Leucemias
156	C23	Vesícula Biliar
140-208	C00-C97	Todas as neoplasias malignas

• **População** - As estimativas populacionais, tanto censitárias (1980, 1991 e contagem populacional de 1996) quanto intercensitárias, utilizadas como denominadores para os cálculos das taxas, foram fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No presente Atlas, as populações são classificadas por faixas etárias.

## Métodos Estatísticos

• **Taxa Bruta de Mortalidade** - A taxa bruta de mortalidade por 100 mil habitantes é definida como a relação entre o total de óbitos e a população total correspondente ao meio do período em determinado local e período. É um indicador que estima o risco de morte nessa dada população, e é calculado a partir da seguinte fórmula:

$$\frac{\text{número de óbitos em determinado local e período}}{\text{População total, em determinado local e período}} \times 100.000$$

• **Taxa Específica de Mortalidade** - A taxa específica de mortalidade por 100 mil habitantes refere-se ao risco de morte devido a um determinado atributo (idade, sexo, estado conjugal, nível sócio-econômico, etc.). Traduz-se pelo quociente entre o total de óbitos por determinado atributo e a população. A taxa específica mais utilizada é a taxa específica por idade que será calculada através da seguinte fórmula:

$$\frac{\text{número de óbitos por câncer, em determinado local e período, por determinado atributo}}{\text{População total no meio do período, em determinado local e período, com o atributo correspondente}} \times 100.000$$

• **Taxas Padronizadas** - A Taxa bruta de mortalidade expressa o real risco de morte a que está submetida uma população e, conseqüentemente, é afetada pela distribuição etária populacional. Conseqüentemente, quando se deseja realizar comparações entre diferentes populações, ou mesmo entre períodos distintos para uma mesma população, é preciso levar em consideração as diferentes estruturas etárias populacionais. A padronização das taxas de mortalidade permite eliminar (ou minimizar) o efeito de diferenças etárias entre populações (ou na mesma população em períodos distintos), a fim de que diferenças geográficas ou temporais não possam ser atribuídas a diferenças na estrutura etária. A padronização por idade é feita usando-se uma população padrão única, que funciona como um grupo comum de “pesos” para o cálculo de taxas “ponderadas” (ditas padronizadas ou “ajustadas”). Duas populações padrão foram utilizadas no presente Atlas: a mundial e a brasileira, que são descritas a seguir.

**População Padrão Mundial** - A população padrão mundial usada neste Atlas é a mais freqüentemente utilizada em todo mundo. Esta população (apresentada abaixo), proposta por Segi (1960), modificada por Doll et al. (1966) e usada nas publicações da série International Agency for Research on Cancer – IARC, Cancer Incidence in Five Continents (“Incidência de Câncer em Cinco Continentes”), é também preconizada por essa Agência. Tal população baseia-se em uma combinação das estruturas etárias de países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

<b>População Padrão Mundial</b>		
<b>Índice</b>	<b>Faixa etária</b>	<b>Total</b>
1	00-04	12.000
2	05-09	10.000
3	10-14	9.000
4	15-19	9.000
5	20-24	8.000
6	25-29	8.000
7	30-34	6.000
8	35-39	6.000
9	40-44	6.000
10	45-49	6.000
11	50-54	5.000
12	55-59	4.000
13	60-64	4.000
14	65-69	3.000
15	70-74	2.000
16	75-79	1.000
17	80 ou +	1.000
<b>Total</b>		<b>100.000</b>

**População Padrão Brasil** - A população padrão brasileira (referida neste trabalho como “população padrão Brasil”) é a População Brasileira da Contagem Populacional de 1996 – IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

<b>População Padrão Brasil</b>		
<b>Índice</b>	<b>Faixa etária</b>	<b>Total</b>
1	00-04	15.666.747
2	05-09	16.441.227
3	10-14	17.568.584
4	15-19	16.723.387
5	20-24	14.445.732
6	25-29	13.000.784
7	30-34	12.422.671
8	35-39	10.911.407
9	40-44	9.261.885
10	45-49	7.463.915
11	50-54	5.882.787
12	55-59	4.854.733
13	60-64	4.002.121
14	65-69	3.238.057
15	70-74	2.271.773
16	75-79	1.457.689
17	80 ou +	1.465.664
<b>Total</b>		<b>157.070.163</b>

## Varição Percentual Anual Estimada - EAPC

A Varição Percentual Anual Estimada (EAPC, ou “Estimated Annual Percent Change”) de mortalidade é apresentada para cada período de cinco anos, desagregada por localização primária e sexo, para o período de 1979 a 1999. Este índice é calculado pelo ajuste de regressão linear ao logarítmico natural das taxas ( $r$ ), utilizando-se o ano calendário como variável regressora; ou seja,  $y = mx + b$  onde  $y = \ln r$  e  $x = \text{ano calendário}$ . O EAPC =  $100(e^m - 1)$  testa a hipótese de que a Varição Percentual Anual é igual a zero, o que é equivalente a testar a hipótese de que a inclinação da linha na equação acima é igual a zero. Tal hipótese é testada, usando-se a distribuição  $t$  de  $m/SE_m$  com o número de graus de liberdade igual ao número de anos calendário menos dois. O erro padrão de  $m$ , isto é  $SE_m$ , é obtido através do ajuste da regressão (Kleinbaum, 1988). Este cálculo supõe que a taxa cresce ou decresce linearmente de ano a ano, durante a totalidade do intervalo de tempo em consideração.

## Anos Potenciais de Vida de Perdidos - APVP

Nesta publicação, para o período de 1995 a 1999, são calculados os Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) para as neoplasias em geral e para os tipos de câncer desagregados por sexo.

O APVP constitui o indicador que melhor traduz a magnitude da mortalidade em populações, já que explicita o total de anos de vida em potencial que são perdidos a cada óbito e, portanto, permite estabelecer a importância da mortalidade prematura enquanto expressão do valor social da morte. Segundo Laurenti (1985), este indicador permite comparar a importância relativa das diferentes causas de morte para uma dada população. Sua grande utilidade é no estabelecimento de prioridades de ações preventivas, principalmente quanto a mortes prematuras. Segundo Romeder *et al.* (1977), o método de calcular o APVP para uma causa ou grupo de causas consiste em somar o número de mortes em cada idade (entre 1 e 70 anos) e multiplicá-lo pelos anos de vida que faltam até os 70 anos. Assim, as principais causas podem ser ordenadas não simplesmente pelo risco de morrer, mas levando-se em consideração o momento (idade) do óbito.

### *Nota de Esclarecimento*

#### **Considerações sobre o aumento da taxa bruta da neoplasia maligna de encéfalo a partir de 1996.**

Os codificadores de causas de morte recebiam a orientação para codificar como maligno o tumor ou a neoplasia que fosse identificada como causa básica, entretanto, sem estar o termo qualificado como maligno, benigno, “in situ”, de comportamento incerto ou de natureza não especificada. Esta orientação tinha, entretanto, a ressalva para as neoplasias do cérebro, que deveriam ser interpretadas como de natureza não especificada. Justificava-se esta orientação com o argumento de que os médicos usavam o termo “neoplasia” como sinônimo de “neoplasia maligna”, tipo este responsável praticamente pela totalidade desses óbitos. A ressalva, entretanto procurava traduzir o fato de que afecções intracranianas, de qualquer natureza, apresentavam-se graves pela própria localização e com uma evolução ruim mesmo não sendo maligna.

Recentemente, investigações de óbitos em que neoplasias cerebrais são mencionadas como causa básica de morte, mostraram que mesmo tais neoplasias, na maioria das vezes, são malignas. Este fato determina uma retificação na orientação anterior. Isto é, para essa localização passa-se a ter a mesma orientação que as outras localizações.

Esta orientação deve ser observada apenas quando o termo for “neoplasia” ou “tumor”. Quando o diagnóstico da neoplasia for apresentado segundo um tipo morfológico específico, tal como “astrocitoma”, “glioma”, “meningioma”, “astroblastoma”, o codificador deverá seguir a orientação do índice da “Classificação Internacional de Doenças”.

“Boletim CBCD, vol 17, no.1/2. Jan/Ago – 1996”

# Características Geográficas e Demográficas

O Brasil encontra-se política e geograficamente dividido em cinco regiões distintas, que possuem traços comuns e diferenciais no que se refere aos aspectos físicos, humanos, econômicos e culturais. A região Norte é a que ocupa a maior parte do território brasileiro, com uma área que corresponde a 45,3% dos 8.547.403,5 de km<sup>2</sup> da área total do País. No Sudeste, região de maior importância econômica, está concentrado também o maior índice populacional - 42,6% dos 169.799.170 brasileiros - e produção industrial. Já o Sul, região mais fria do País, com ocorrências de geadas e neve, é a que apresenta menor área, ocupando 6,8% do território brasileiro. Finalmente, a região Centro-Oeste tem sua área dominada basicamente pelo Planalto Central Brasileiro e pode ser dividida em três porções: maciço goiano-mato-grossense, bacia de sedimentação do Paraná e as depressões.

Com 3.869.637,9 km<sup>2</sup> de área, a região Norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Está localizada entre o maciço das Guianas, ao Norte; o Planalto Central, ao Sul; a Cordilheira dos Andes, a Oeste; e o Oceano Atlântico, a Noroeste. A região Norte possui 12.900.704 habitantes e uma expectativa de vida de 68,2 anos. Sua densidade demográfica é a mais baixa dentre todas as regiões geográficas, com 2,92 habitantes por km<sup>2</sup>. A maior parte da população da região Norte (69,9%) é urbana, sendo Belém, capital do Estado do Pará, sua maior metrópole.

A região Nordeste inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ocupando área de 1.561.177,8 km<sup>2</sup>, o que corresponde a 18,3% da área total do País. Sua população totaliza 47.741.711 habitantes, o que representa 28,1% do total do País. A expectativa de vida nesta região é a menor do País: 65,5 anos. Sua densidade demográfica é de 28,7 habitantes por km<sup>2</sup> e a maior parte da população concentra-se na zona urbana (69,1%).

A região Centro-Oeste ocupa 18,9% do território brasileiro, com uma área de 1.612.077,2 km<sup>2</sup>, e é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Distrito Federal. A população é de 11.636.728 habitantes, com densidade demográfica de 6,5 habitantes por km<sup>2</sup>. A maioria - 86,7% dos habitantes - se concentra na zona urbana. A expectativa de vida nesta região é de 69,2 anos.

Formada pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a região Sudeste ocupa 10,9% do território brasileiro, com uma área de 927.286,2 km<sup>2</sup>. A região Sudeste é a de maior população, somando 72.412.411 habitantes, sendo que a expectativa de vida é de 70,8 anos. É também a região com maior densidade demográfica (72,3 habitantes por km<sup>2</sup>) e mais alto índice de urbanização: 90,5%.

Com 577.214 km<sup>2</sup>, a região Sul é a região que apresenta menor área, ocupando apenas 6,8% do território brasileiro, sendo formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A população totaliza 25.107.616 habitantes, com expectativa de vida de 70,8 anos, a maior do Brasil. A densidade demográfica é de 40,7 habitantes por km<sup>2</sup> e 80,9% da população vivem no meio urbano.

O Brasil tem mais de 8,5 milhões de km<sup>2</sup> de área e população de 169.799.170 milhões de habitantes no ano de 2000, sendo 83.576.015 (49,2 %) homens e 86.223.155 (50,8 %) mulheres, sendo de 101.593.233 (60 %) habitantes com idade igual ou acima de 20 anos.


A população brasileira cresce mais lentamente desde meados dos anos 70 e começa a apresentar idade média maior.

De acordo com outros indicadores e com a pesquisa sobre as condições de vida no mundo, realizada pela ONU em 1996, a renda média dos 10% mais ricos da população é cerca de 30 vezes superior à renda média dos 40% mais pobres. Em outros países, onde a distribuição de renda é mais equilibrada, os mais ricos ganham em média dez vezes mais do que os mais pobres.




**MORTALIDADE PROPORCIONAL  
POR CÂNCER, NÃO AJUSTADA,  
EM HOMENS E MULHERES,  
ENTRE 1979 E 1999.**

**Mortalidade proporcional não ajustada por câncer, Brasil, homens e mulheres, entre 1979 e 1999.**




DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO TOTAL DE  
MORTES POR CÂNCER, SEGUNDO LOCALIZAÇÃO  
PRIMÁRIA DO TUMOR, EM HOMENS E EM  
MULHERES, PARA OS PERÍODOS ENTRE  
1979 E 1983 E ENTRE 1995 E 1999

# BRASIL




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# ACRE




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.


# ALAGOAS




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# AMAZONAS




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



# BAHIA




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# CEARÁ




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# DISTRITO FEDERAL




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.


## ESPÍRITO SANTO




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# MARANHÃO




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# MATO GROSSO




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

## MATO GROSSO DO SUL




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



# MINAS GERAIS




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.


# PARÁ




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# PARANÁ




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.


# PERNAMBUCO

Distribuição proporcional do total de mortes por câncer, segundo localização primária do tumor, em homens, para os períodos entre 1979 e 1983 e entre 1995 e 1999.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

Distribuição proporcional do total de mortes por câncer, segundo localização primária do tumor, em mulheres, para os períodos entre 1979 e 1983 e entre 1995 e 1999.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# PIAUI




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# RIO DE JANEIRO




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

## RIO GRANDE DO NORTE




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



# RIO GRANDE DO SUL




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# RONDÔNIA




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# RORAIMA




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# SANTA CATARINA




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# SÃO PAULO




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# SERGIPE




Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

# TOCANTINS



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.



Nota: Os valores apresentados no gráfico encontram-se em percentual.

Observação: Devido a criação do estado de Tocantins ter ocorrido em 1989, os dados para o 1º período não são apresentados.

**TAXAS DE MORTALIDADE POR CÂNCER  
BRUTAS E AJUSTADAS POR IDADE PELAS  
POPULAÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA, POR  
100.000, SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA,  
ENTRE 1979 E 1983 E ENTRE 1995 E 1999**



## BRASIL

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	2.208	8,90	1.917	4,75
5 a 9 anos	1.669	7,37	1.135	3,06
10 a 14 anos	1.346	6,19	1.076	2,97
15 a 19 anos	1.923	9,50	1.413	4,08
20 a 29 anos	3.937	24,27	3.576	6,54
30 a 39 anos	6.465	17,77	8.777	23,43
40 a 49 anos	17.987	67,28	18.722	68,91
50 a 59 anos	36.655	197,73	28.606	150,82
60 a 69 anos	45.169	397,75	31.808	262,13
70 a 79 anos	37.453	708,79	27.927	460,31
80 anos e +	13.477	1.006,37	12.911	662,28
<b>Total</b>	<b>168.289</b>	-	<b>137.868</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>55,62</b>	-	<b>44,95</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>94,27</b>	-	<b>65,99</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>75,25</b>	-	<b>52,86</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	1.926	4,72	1.680	4,25
5 a 9 anos	1.739	4,10	1.291	3,13
10 a 14 anos	1.691	3,77	1.299	2,96
15 a 19 anos	2.447	5,75	1.660	3,92
20 a 29 anos	5.115	7,39	4.747	6,68
30 a 39 anos	9.830	17,09	14.158	23,29
40 a 49 anos	26.528	64,02	30.566	70,13
50 a 59 anos	51.275	195,22	43.781	155,19
60 a 69 anos	77.249	454,46	56.069	287,89
70 a 79 anos	70.885	836,75	52.007	503,80
80 anos e +	36.164	1.276,96	34.235	816,58
<b>Total</b>	<b>284.849</b>	-	<b>241.493</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>72,34</b>	-	<b>59,67</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>100,00</b>	-	<b>71,12</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>78,41</b>	-	<b>56,88</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	1	1,17	3	2,18
5 a 9 anos	4	5,45	4	3,35
10 a 14 anos	3	4,72	5	4,76
15 a 19 anos	1	1,94	3	3,35
20 a 29 anos	5	12,76	4	3,17
30 a 39 anos	10	12,22	15	19,21
40 a 49 anos	21	36,22	26	53,86
50 a 59 anos	43	109,43	28	93,72
60 a 69 anos	58	247,61	20	107,38
70 a 79 anos	38	407,77	32	410,52
80 anos e +	13	610,62	4	203,15
<b>Total</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>144</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>24,49</b>	<b>-</b>	<b>18,90</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>54,66</b>	<b>-</b>	<b>40,90</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>43,46</b>	<b>-</b>	<b>33,51</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	5	2,93	4	2,38
5 a 9 anos	4	2,39	6	3,68
10 a 14 anos	5	2,97	1	0,60
15 a 19 anos	3	1,95	5	3,26
20 a 29 anos	16	7,29	13	5,92
30 a 39 anos	21	13,97	40	26,58
40 a 49 anos	34	32,69	41	41,87
50 a 59 anos	66	107,79	65	112,57
60 a 69 anos	85	215,08	58	165,93
70 a 79 anos	96	452,76	51	305,65
80 anos e +	42	550,32	27	349,60
<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>-</b>	<b>311</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>29,80</b>	<b>-</b>	<b>25,16</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>51,64</b>	<b>-</b>	<b>44,57</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>40,96</b>	<b>-</b>	<b>36,24</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## ALAGOAS

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	18	3,66	23	2,79
5 a 9 anos	8	1,81	21	2,84
10 a 14 anos	11	2,71	9	1,30
15 a 19 anos	14	4,19	14	2,37
20 a 29 anos	43	18,73	41	5,00
30 a 39 anos	61	11,96	105	19,13
40 a 49 anos	112	30,78	211	53,60
50 a 59 anos	210	84,53	222	83,62
60 a 69 anos	257	137,83	272	141,22
70 a 79 anos	217	227,23	207	206,02
80 anos e +	71	315,63	63	208,84
<b>Total</b>	<b>1.022</b>	-	<b>1.188</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>20,48</b>	-	<b>22,86</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>36,60</b>	-	<b>36,16</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>30,01</b>	-	<b>29,38</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, por câncer, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	26	3,11	20	2,43
5 a 9 anos	21	2,56	12	1,48
10 a 14 anos	27	3,19	18	2,13
15 a 19 anos	29	3,72	30	3,80
20 a 29 anos	52	4,57	56	4,60
30 a 39 anos	96	12,15	169	19,43
40 a 49 anos	166	29,56	301	49,03
50 a 59 anos	292	80,67	347	85,65
60 a 69 anos	368	164,51	382	140,74
70 a 79 anos	358	283,97	329	230,93
80 anos e +	212	411,03	199	314,89
<b>Total</b>	<b>1.647</b>	-	<b>1.863</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>25,18</b>	-	<b>27,18</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>38,39</b>	-	<b>37,56</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>30,66</b>	-	<b>30,63</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	4	7,91	2	2,38
5 a 9 anos	1	2,25	3	4,05
10 a 14 anos	3	7,87	-	-
15 a 19 anos	2	6,57	4	7,43
20 a 29 anos	2	9,11	6	7,88
30 a 39 anos	4	8,44	9	19,23
40 a 49 anos	20	62,10	30	100,39
50 a 59 anos	25	129,90	21	125,22
60 a 69 anos	32	294,52	17	161,03
70 a 79 anos	50	877,81	36	565,68
80 anos e +	26	1.809,32	12	626,96
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>36,01</b>	<b>-</b>	<b>30,06</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>89,13</b>	<b>-</b>	<b>62,76</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>71,98</b>	<b>-</b>	<b>51,49</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	10	7,00	12	8,67
5 a 9 anos	9	6,71	7	5,39
10 a 14 anos	3	2,24	3	2,23
15 a 19 anos	5	4,23	12	9,70
20 a 29 anos	18	9,58	12	6,32
30 a 39 anos	21	15,98	32	25,25
40 a 49 anos	43	54,93	60	82,92
50 a 59 anos	54	121,68	53	132,79
60 a 69 anos	101	432,97	62	269,52
70 a 79 anos	76	797,41	31	309,90
80 anos e +	66	1.428,75	55	867,56
<b>Total</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	<b>339</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>40,19</b>	<b>-</b>	<b>34,08</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>91,61</b>	<b>-</b>	<b>65,44</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>72,30</b>	<b>-</b>	<b>53,18</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## AMAZONAS

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	20	4,99	8	1,21
5 a 9 anos	10	2,91	9	1,58
10 a 14 anos	13	4,41	9	1,81
15 a 19 anos	22	8,93	19	4,43
20 a 29 anos	40	21,28	42	6,78
30 a 39 anos	64	16,14	116	30,37
40 a 49 anos	114	41,28	181	72,41
50 a 59 anos	238	139,79	183	121,51
60 a 69 anos	296	293,53	184	200,88
70 a 79 anos	204	505,39	151	359,67
80 anos e +	64	769,69	45	415,21
<b>Total</b>	<b>1.085</b>	-	<b>947</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>28,62</b>	-	<b>25,56</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>68,37</b>	-	<b>54,22</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>54,86</b>	-	<b>44,22</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	28	3,27	39	4,62
5 a 9 anos	29	3,60	20	2,54
10 a 14 anos	18	2,22	23	2,86
15 a 19 anos	39	5,23	35	4,68
20 a 29 anos	66	5,97	107	9,61
30 a 39 anos	116	14,86	178	23,02
40 a 49 anos	241	48,49	378	79,83
50 a 59 anos	399	139,69	389	142,02
60 a 69 anos	546	323,62	413	248,98
70 a 79 anos	447	560,94	337	421,59
80 anos e +	213	853,40	166	537,62
<b>Total</b>	<b>2.142</b>	-	<b>2.085</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>34,67</b>	-	<b>34,20</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>70,57</b>	-	<b>63,60</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>55,50</b>	-	<b>51,21</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# BAHIA

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	133	5,82	127	3,40
5 a 9 anos	82	3,94	57	1,67
10 a 14 anos	70	3,63	62	1,91
15 a 19 anos	78	4,85	68	2,44
20 a 29 anos	155	13,75	163	4,19
30 a 39 anos	245	9,90	410	15,52
40 a 49 anos	572	31,04	800	41,18
50 a 59 anos	1.052	82,38	1.147	87,60
60 a 69 anos	1.337	152,76	1.197	131,38
70 a 79 anos	1.238	275,38	1.055	213,61
80 anos e +	491	413,46	471	279,56
<b>Total</b>	<b>5.453</b>	-	<b>5.557</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>22,74</b>	-	<b>22,65</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>39,47</b>	-	<b>34,72</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>32,06</b>	-	<b>28,05</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	89	2,60	79	2,37
5 a 9 anos	84	2,29	65	1,81
10 a 14 anos	91	2,21	73	1,80
15 a 19 anos	124	3,20	85	2,22
20 a 29 anos	259	4,79	252	4,49
30 a 39 anos	418	10,55	671	15,86
40 a 49 anos	952	33,89	1.323	44,57
50 a 59 anos	1.761	94,50	1.900	93,39
60 a 69 anos	2.445	205,48	2.145	156,62
70 a 79 anos	2.603	383,81	1.895	248,29
80 anos e +	1.562	555,45	1.417	376,78
<b>Total</b>	<b>10.388</b>	-	<b>9.905</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>33,18</b>	-	<b>30,79</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>47,09</b>	-	<b>39,38</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>37,21</b>	-	<b>31,67</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# CEARÁ

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	41	3,42	37	1,88
5 a 9 anos	30	2,71	23	1,26
10 a 14 anos	32	2,96	29	1,60
15 a 19 anos	45	4,79	21	1,28
20 a 29 anos	84	14,29	95	4,31
30 a 39 anos	109	8,05	203	13,29
40 a 49 anos	250	24,92	418	37,01
50 a 59 anos	493	65,06	593	72,28
60 a 69 anos	603	121,26	517	97,84
70 a 79 anos	558	201,88	450	154,24
80 anos e +	260	301,07	229	220,93
<b>Total</b>	<b>2.505</b>	-	<b>2.615</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>19,06</b>	-	<b>18,88</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>31,03</b>	-	<b>27,53</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>25,38</b>	-	<b>22,41</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	117	5,60	85	4,20
5 a 9 anos	85	4,04	69	3,37
10 a 14 anos	71	3,37	61	2,93
15 a 19 anos	94	4,97	52	2,71
20 a 29 anos	199	7,14	168	5,58
30 a 39 anos	279	13,18	428	18,20
40 a 49 anos	631	42,76	975	58,21
50 a 59 anos	1.126	110,26	1.289	109,74
60 a 69 anos	1.596	231,66	1.551	189,35
70 a 79 anos	1.741	417,40	1.431	300,42
80 anos e +	1.152	707,30	829	408,58
<b>Total</b>	<b>7.091</b>	-	<b>6.938</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>42,02</b>	-	<b>39,02</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>55,42</b>	-	<b>47,64</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>44,23</b>	-	<b>38,33</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# DISTRITO FEDERAL

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	48	18,03	51	11,91
5 a 9 anos	26	12,18	29	8,22
10 a 14 anos	17	8,56	22	6,23
15 a 19 anos	35	17,96	30	7,81
20 a 29 anos	63	34,10	54	7,87
30 a 39 anos	68	16,83	110	25,11
40 a 49 anos	147	55,09	227	88,88
50 a 59 anos	273	200,24	299	220,20
60 a 69 anos	323	561,28	317	468,51
70 a 79 anos	241	1.327,38	216	836,20
80 anos e +	65	1.673,53	67	941,01
<b>Total</b>	<b>1.306</b>	<b>-</b>	<b>1.422</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>43,99</b>	<b>-</b>	<b>45,37</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>133,72</b>	<b>-</b>	<b>105,56</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>106,62</b>	<b>-</b>	<b>83,19</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	26	5,48	26	5,63
5 a 9 anos	19	4,10	16	3,52
10 a 14 anos	29	5,85	13	2,60
15 a 19 anos	45	8,77	42	7,34
20 a 29 anos	96	10,31	81	7,78
30 a 39 anos	124	17,91	227	28,54
40 a 49 anos	303	64,94	399	75,63
50 a 59 anos	552	207,84	563	197,89
60 a 69 anos	753	580,75	585	399,06
70 a 79 anos	629	1.318,20	530	828,30
80 anos e +	325	2.225,07	299	1.118,98
<b>Total</b>	<b>2.901</b>	<b>-</b>	<b>2.781</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>64,51</b>	<b>-</b>	<b>57,05</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>135,13</b>	<b>-</b>	<b>97,45</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>106,61</b>	<b>-</b>	<b>77,44</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE



## ESPÍRITO SANTO

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	37	8,67	34	4,91
5 a 9 anos	21	5,45	18	2,86
10 a 14 anos	29	7,61	17	2,70
15 a 19 anos	30	8,16	23	3,73
20 a 29 anos	63	21,06	59	6,12
30 a 39 anos	108	17,86	122	20,21
40 a 49 anos	288	65,30	270	61,93
50 a 59 anos	556	183,72	335	115,05
60 a 69 anos	662	356,86	428	232,97
70 a 79 anos	680	749,34	396	425,15
80 anos e +	235	960,75	168	531,85
<b>Total</b>	<b>2.709</b>	<b>-</b>	<b>1.870</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>51,66</b>	<b>-</b>	<b>36,17</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>89,95</b>	<b>-</b>	<b>57,03</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>71,98</b>	<b>-</b>	<b>45,68</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	37	5,27	23	3,39
5 a 9 anos	33	4,35	22	3,01
10 a 14 anos	35	4,30	22	2,78
15 a 19 anos	62	7,92	36	4,65
20 a 29 anos	88	6,96	90	7,01
30 a 39 anos	182	16,60	263	23,24
40 a 49 anos	479	62,34	518	66,73
50 a 59 anos	844	191,16	690	147,24
60 a 69 anos	1.310	433,10	873	263,36
70 a 79 anos	1.203	855,75	766	475,57
80 anos e +	640	1.326,08	540	795,58
<b>Total</b>	<b>4.913</b>	<b>-</b>	<b>3.843</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>69,00</b>	<b>-</b>	<b>53,39</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>99,21</b>	<b>-</b>	<b>67,20</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>78,10</b>	<b>-</b>	<b>53,99</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	70	10,53	48	4,49
5 a 9 anos	59	9,36	38	3,71
10 a 14 anos	56	9,14	35	3,44
15 a 19 anos	69	12,23	41	4,28
20 a 29 anos	86	20,67	93	6,38
30 a 39 anos	134	13,43	232	24,14
40 a 49 anos	338	46,88	408	62,53
50 a 59 anos	553	123,61	614	152,06
60 a 69 anos	675	265,65	548	230,94
70 a 79 anos	595	543,25	429	419,56
80 anos e +	206	789,30	139	484,52
<b>Total</b>	<b>2.841</b>	-	<b>2.625</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>34,84</b>	-	<b>33,18</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>68,58</b>	-	<b>60,31</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>55,74</b>	-	<b>48,42</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	57	4,76	56	4,88
5 a 9 anos	55	4,52	29	2,48
10 a 14 anos	51	4,01	43	3,47
15 a 19 anos	68	5,42	47	3,74
20 a 29 anos	156	7,09	151	6,67
30 a 39 anos	257	14,67	412	22,52
40 a 49 anos	624	51,93	737	61,42
50 a 59 anos	1.133	150,11	1.099	149,69
60 a 69 anos	1.647	363,77	1.219	266,54
70 a 79 anos	1.483	723,58	912	441,81
80 anos e +	798	1.231,54	557	734,99
<b>Total</b>	<b>6.329</b>	-	<b>5.262</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>54,66</b>	-	<b>45,44</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>84,00</b>	-	<b>65,36</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>66,40</b>	-	<b>52,29</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# MARANHÃO

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	20	1,89	22	1,26
5 a 9 anos	13	1,44	8	0,54
10 a 14 anos	14	1,74	15	1,10
15 a 19 anos	18	2,70	11	0,95
20 a 29 anos	26	6,04	38	2,35
30 a 39 anos	44	4,21	109	10,04
40 a 49 anos	89	11,13	201	26,00
50 a 59 anos	186	36,36	214	44,46
60 a 69 anos	188	55,51	160	48,24
70 a 79 anos	168	95,69	146	80,53
80 anos e +	46	146,99	44	105,87
<b>Total</b>	<b>812</b>	<b>-</b>	<b>968</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>7,97</b>	<b>-</b>	<b>9,42</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>15,07</b>	<b>-</b>	<b>15,94</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>12,34</b>	<b>-</b>	<b>13,20</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	29	1,74	19	1,16
5 a 9 anos	24	1,33	21	1,19
10 a 14 anos	25	1,34	16	0,87
15 a 19 anos	36	2,22	23	1,44
20 a 29 anos	63	2,99	60	2,78
30 a 39 anos	107	7,38	178	11,31
40 a 49 anos	178	16,68	345	31,12
50 a 59 anos	317	43,90	389	51,07
60 a 69 anos	455	93,02	396	81,34
70 a 79 anos	397	150,55	288	106,62
80 anos e +	194	204,59	153	130,53
<b>Total</b>	<b>1.825</b>	<b>-</b>	<b>1.888</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>13,86</b>	<b>-</b>	<b>14,17</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>21,05</b>	<b>-</b>	<b>20,79</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>16,82</b>	<b>-</b>	<b>16,91</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# MATO GROSSO

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	16	5,80	16	3,50
5 a 9 anos	19	7,46	6	1,44
10 a 14 anos	2	0,86	7	1,80
15 a 19 anos	23	11,11	10	2,85
20 a 29 anos	20	12,20	22	4,09
30 a 39 anos	45	11,36	43	12,39
40 a 49 anos	85	31,68	78	36,31
50 a 59 anos	121	74,16	89	72,71
60 a 69 anos	148	158,23	75	107,70
70 a 79 anos	118	320,05	74	254,50
80 anos e +	46	566,64	20	236,16
<b>Total</b>	<b>643</b>	<b>-</b>	<b>440</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>20,04</b>	<b>-</b>	<b>14,95</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>42,66</b>	<b>-</b>	<b>31,56</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>34,97</b>	<b>-</b>	<b>25,54</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	32	4,88	27	4,28
5 a 9 anos	26	3,90	16	2,51
10 a 14 anos	32	4,68	19	2,90
15 a 19 anos	25	3,88	26	4,15
20 a 29 anos	73	6,63	52	4,86
30 a 39 anos	123	13,63	203	23,97
40 a 49 anos	274	46,20	362	69,05
50 a 59 anos	515	145,12	413	138,12
60 a 69 anos	683	339,78	387	234,50
70 a 79 anos	597	713,26	267	392,10
80 anos e +	299	1.167,53	149	597,64
<b>Total</b>	<b>2.679</b>	<b>-</b>	<b>1.921</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>45,24</b>	<b>-</b>	<b>34,61</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>79,90</b>	<b>-</b>	<b>59,92</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>63,14</b>	<b>-</b>	<b>48,21</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## MATO GROSSO DO SUL

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	26	8,75	19	3,93
5 a 9 anos	23	8,12	13	2,85
10 a 14 anos	20	7,48	12	2,74
15 a 19 anos	26	10,43	30	7,32
20 a 29 anos	51	27,95	35	5,60
30 a 39 anos	61	13,93	133	31,99
40 a 49 anos	160	49,59	186	66,82
50 a 59 anos	331	160,90	243	143,04
60 a 69 anos	374	308,90	245	246,87
70 a 79 anos	332	647,30	195	455,76
80 anos e +	133	1.049,97	74	586,84
<b>Total</b>	<b>1.537</b>	<b>-</b>	<b>1.185</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>42,37</b>	<b>-</b>	<b>34,53</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>81,59</b>	<b>-</b>	<b>64,11</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>66,10</b>	<b>-</b>	<b>51,92</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	33	6,22	30	5,84
5 a 9 anos	26	4,77	22	4,20
10 a 14 anos	24	4,27	18	3,31
15 a 19 anos	32	6,13	23	4,45
20 a 29 anos	83	9,53	66	7,43
30 a 39 anos	130	17,59	186	24,25
40 a 49 anos	321	62,52	412	81,36
50 a 59 anos	606	187,52	528	170,74
60 a 69 anos	879	435,04	581	300,60
70 a 79 anos	771	799,76	523	569,21
80 anos e +	455	1.383,86	378	1.057,08
<b>Total</b>	<b>3.360</b>	<b>-</b>	<b>2.767</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>67,97</b>	<b>-</b>	<b>56,58</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>98,46</b>	<b>-</b>	<b>79,74</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>77,70</b>	<b>-</b>	<b>64,13</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# MINAS GERAIS

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	273	10,05	247	5,61
5 a 9 anos	187	7,41	117	2,84
10 a 14 anos	161	6,42	129	3,11
15 a 19 anos	222	9,29	175	4,34
20 a 29 anos	462	26,99	394	6,49
30 a 39 anos	690	17,55	865	21,41
40 a 49 anos	1.888	63,01	2.008	66,33
50 a 59 anos	3.636	176,89	3.144	149,84
60 a 69 anos	4.769	366,61	3.731	270,33
70 a 79 anos	4.357	750,98	3.239	487,88
80 anos e +	1.561	1.061,68	1.543	720,12
<b>Total</b>	<b>18.206</b>	-	<b>15.592</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>53,67</b>	-	<b>45,61</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>92,08</b>	-	<b>67,44</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>74,02</b>	-	<b>53,89</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	195	4,75	172	4,33
5 a 9 anos	179	4,08	137	3,23
10 a 14 anos	166	3,57	139	3,07
15 a 19 anos	270	5,96	176	3,95
20 a 29 anos	532	7,28	423	5,73
30 a 39 anos	999	15,87	1.366	20,91
40 a 49 anos	2.615	57,85	2.861	61,29
50 a 59 anos	4.903	169,80	4.335	140,80
60 a 69 anos	7.536	390,60	5.735	261,03
70 a 79 anos	7.167	768,45	5.488	476,86
80 anos e +	4.017	1.282,84	3.815	800,34
<b>Total</b>	<b>28.579</b>	-	<b>24.647</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>68,23</b>	-	<b>57,73</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>90,35</b>	-	<b>65,51</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>71,32</b>	-	<b>52,45</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# PARÁ

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	33	3,68	40	2,72
5 a 9 anos	33	4,17	20	1,54
10 a 14 anos	26	3,74	20	1,70
15 a 19 anos	32	5,52	25	2,47
20 a 29 anos	73	17,08	75	5,09
30 a 39 anos	102	10,46	199	21,38
40 a 49 anos	266	38,98	340	54,80
50 a 59 anos	472	110,78	392	101,43
60 a 69 anos	563	221,96	418	166,25
70 a 79 anos	481	406,66	389	286,38
80 anos e +	160	642,34	147	377,05
<b>Total</b>	<b>2.241</b>	<b>-</b>	<b>2.065</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>24,85</b>	<b>-</b>	<b>23,48</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>54,49</b>	<b>-</b>	<b>43,94</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>43,81</b>	<b>-</b>	<b>35,60</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	63	3,32	57	3,12
5 a 9 anos	51	2,75	34	1,90
10 a 14 anos	42	2,25	35	1,92
15 a 19 anos	63	3,75	42	2,53
20 a 29 anos	139	5,51	128	5,13
30 a 39 anos	182	10,16	320	18,26
40 a 49 anos	384	31,38	610	53,15
50 a 59 anos	666	89,23	713	100,87
60 a 69 anos	960	215,26	717	165,90
70 a 79 anos	840	415,56	612	288,62
80 anos e +	431	569,83	459	458,27
<b>Total</b>	<b>3.821</b>	<b>-</b>	<b>3.727</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>26,67</b>	<b>-</b>	<b>26,71</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>48,35</b>	<b>-</b>	<b>44,29</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>38,17</b>	<b>-</b>	<b>35,83</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# PARAÍBA

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	24	3,79	28	2,69
5 a 9 anos	26	4,42	12	1,24
10 a 14 anos	20	3,55	9	0,94
15 a 19 anos	24	5,00	19	2,27
20 a 29 anos	42	16,33	49	4,53
30 a 39 anos	63	9,79	118	15,29
40 a 49 anos	133	26,65	215	35,72
50 a 59 anos	236	57,85	279	59,95
60 a 69 anos	336	106,40	320	97,19
70 a 79 anos	282	163,59	232	129,63
80 anos e +	119	236,20	106	175,83
<b>Total</b>	<b>1.305</b>	<b>-</b>	<b>1.387</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>19,24</b>	<b>-</b>	<b>19,03</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>28,58</b>	<b>-</b>	<b>25,43</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>23,79</b>	<b>-</b>	<b>20,85</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	27	2,96	23	2,59
5 a 9 anos	20	2,07	18	1,90
10 a 14 anos	35	3,41	23	2,27
15 a 19 anos	25	2,62	26	2,72
20 a 29 anos	61	4,52	70	4,78
30 a 39 anos	90	9,16	101	9,19
40 a 49 anos	184	26,13	293	35,76
50 a 59 anos	272	54,06	382	62,22
60 a 69 anos	458	130,71	434	98,56
70 a 79 anos	447	180,29	386	137,01
80 anos e +	292	289,30	223	183,11
<b>Total</b>	<b>1.911</b>	<b>-</b>	<b>1.979</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>23,58</b>	<b>-</b>	<b>22,89</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>28,38</b>	<b>-</b>	<b>25,55</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>22,74</b>	<b>-</b>	<b>20,71</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE



# PARANÁ

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	187	12,19	150	6,05
5 a 9 anos	166	11,12	100	4,15
10 a 14 anos	122	8,17	95	3,91
15 a 19 anos	167	12,27	98	4,28
20 a 29 anos	274	28,30	275	7,98
30 a 39 anos	499	21,33	599	25,62
40 a 49 anos	1.423	80,89	1.254	75,96
50 a 59 anos	2.685	229,93	1.829	169,19
60 a 69 anos	3.274	483,70	1.968	306,73
70 a 79 anos	2.660	904,61	1.560	561,06
80 anos e +	902	1.324,13	593	757,02
<b>Total</b>	<b>12.359</b>	-	<b>8.521</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>63,58</b>	-	<b>44,54</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>116,14</b>	-	<b>76,44</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>92,89</b>	-	<b>61,12</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	128	5,50	121	5,40
5 a 9 anos	127	5,36	93	4,07
10 a 14 anos	114	4,67	72	3,04
15 a 19 anos	163	6,97	112	4,85
20 a 29 anos	363	8,95	324	7,79
30 a 39 anos	707	20,57	987	27,13
40 a 49 anos	1.968	79,82	2.082	81,27
50 a 59 anos	3.706	232,33	3.008	183,72
60 a 69 anos	5.758	557,66	3.783	345,70
70 a 79 anos	5.174	1.094,58	3.408	642,79
80 anos e +	2.487	1.762,08	1.938	1.041,39
<b>Total</b>	<b>20.695</b>	-	<b>15.928</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>91,23</b>	-	<b>69,24</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>126,13</b>	-	<b>86,45</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>99,19</b>	-	<b>69,12</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# PERNAMBUCO

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	92	6,74	77	3,44
5 a 9 anos	59	4,62	33	1,56
10 a 14 anos	43	3,56	42	2,05
15 a 19 anos	69	6,61	50	2,71
20 a 29 anos	129	20,24	155	6,00
30 a 39 anos	200	12,82	387	21,43
40 a 49 anos	398	33,49	831	60,22
50 a 59 anos	828	91,90	1.057	106,93
60 a 69 anos	1.027	166,11	1.024	154,01
70 a 79 anos	924	299,62	860	237,28
80 anos e +	308	401,56	322	292,90
<b>Total</b>	<b>4.077</b>	<b>-</b>	<b>4.838</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>27,03</b>	<b>-</b>	<b>29,98</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>43,88</b>	<b>-</b>	<b>42,21</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>35,96</b>	<b>-</b>	<b>34,35</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	89	4,58	76	4,00
5 a 9 anos	71	3,40	47	2,29
10 a 14 anos	81	3,66	64	2,92
15 a 19 anos	106	5,02	80	3,77
20 a 29 anos	218	6,82	262	7,62
30 a 39 anos	391	16,76	646	24,45
40 a 49 anos	816	49,29	1.324	68,61
50 a 59 anos	1.449	127,28	1.879	137,78
60 a 69 anos	2.116	281,08	2.188	234,26
70 a 79 anos	2.258	503,54	1.931	364,40
80 anos e +	1.217	774,52	1.282	599,38
<b>Total</b>	<b>8.812</b>	<b>-</b>	<b>9.779</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>48,78</b>	<b>-</b>	<b>50,64</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>64,67</b>	<b>-</b>	<b>59,42</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>51,36</b>	<b>-</b>	<b>47,95</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# PIAUÍ

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	10	1,86	10	1,13
5 a 9 anos	8	1,66	7	0,88
10 a 14 anos	9	2,01	7	0,91
15 a 19 anos	11	2,89	6	0,89
20 a 29 anos	22	10,07	29	3,33
30 a 39 anos	38	7,22	62	10,79
40 a 49 anos	52	13,37	118	28,42
50 a 59 anos	109	39,98	147	52,69
60 a 69 anos	139	76,37	120	63,80
70 a 79 anos	113	117,86	100	100,90
80 anos e +	22	99,73	34	126,27
<b>Total</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>9,96</b>	<b>-</b>	<b>11,49</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>18,39</b>	<b>-</b>	<b>19,12</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>15,09</b>	<b>-</b>	<b>15,68</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	10	1,31	14	1,90
5 a 9 anos	16	1,90	15	1,82
10 a 14 anos	14	1,54	10	1,12
15 a 19 anos	17	2,05	16	1,93
20 a 29 anos	44	4,09	25	2,15
30 a 39 anos	59	7,55	93	10,64
40 a 49 anos	143	25,10	198	31,49
50 a 59 anos	242	61,64	288	66,50
60 a 69 anos	357	135,48	320	109,01
70 a 79 anos	363	251,45	259	164,19
80 anos e +	165	299,51	141	206,49
<b>Total</b>	<b>1.430</b>	<b>-</b>	<b>1.379</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>21,58</b>	<b>-</b>	<b>19,97</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>30,81</b>	<b>-</b>	<b>26,69</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>24,38</b>	<b>-</b>	<b>21,35</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# RIO DE JANEIRO

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	256	13,56	245	8,04
5 a 9 anos	217	12,41	156	5,48
10 a 14 anos	162	9,41	121	4,25
15 a 19 anos	250	13,99	196	6,43
20 a 29 anos	542	34,47	490	8,75
30 a 39 anos	957	25,24	1.241	30,67
40 a 49 anos	2.975	101,82	2.985	96,14
50 a 59 anos	6.340	300,58	4.870	209,99
60 a 69 anos	7.233	607,84	5.539	382,57
70 a 79 anos	6.012	1.155,29	5.034	694,21
80 anos e +	2.280	1.696,19	2.768	1.055,25
<b>Total</b>	<b>27.224</b>	-	<b>23.645</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>97,40</b>	-	<b>80,73</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>146,96</b>	-	<b>96,15</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>117,27</b>	-	<b>76,94</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	178	6,17	161	5,75
5 a 9 anos	160	5,43	130	4,56
10 a 14 anos	171	5,48	126	4,11
15 a 19 anos	228	7,20	146	4,57
20 a 29 anos	481	8,53	476	8,04
30 a 39 anos	1.119	21,24	1.734	29,79
40 a 49 anos	3.241	79,73	4.058	88,71
50 a 59 anos	6.384	245,80	5.810	194,73
60 a 69 anos	10.479	594,47	8.096	361,74
70 a 79 anos	9.169	1.125,30	7.660	646,23
80 anos e +	4.470	1.876,45	5.050	1.069,62
<b>Total</b>	<b>36.080</b>	-	<b>33.447</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>110,88</b>	-	<b>95,28</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>132,17</b>	-	<b>90,37</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>103,79</b>	-	<b>72,36</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## RIO GRANDE DO NORTE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	22	5,21	13	1,87
5 a 9 anos	17	4,40	12	1,87
10 a 14 anos	20	5,21	11	1,69
15 a 19 anos	18	5,23	21	3,52
20 a 29 anos	29	15,09	35	4,45
30 a 39 anos	44	9,03	90	16,19
40 a 49 anos	97	28,06	170	42,63
50 a 59 anos	185	65,84	236	78,04
60 a 69 anos	310	149,87	209	101,37
70 a 79 anos	258	221,49	208	176,90
80 anos e +	123	338,32	92	222,44
<b>Total</b>	<b>1.123</b>	<b>-</b>	<b>1.097</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>23,57</b>	<b>-</b>	<b>21,97</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>35,32</b>	<b>-</b>	<b>30,30</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>28,83</b>	<b>-</b>	<b>24,88</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	37	5,16	36	5,17
5 a 9 anos	25	3,32	28	3,81
10 a 14 anos	28	3,60	22	2,85
15 a 19 anos	45	6,33	25	3,49
20 a 29 anos	63	5,70	60	5,18
30 a 39 anos	95	11,19	161	17,37
40 a 49 anos	238	42,84	319	50,49
50 a 59 anos	409	108,27	540	122,22
60 a 69 anos	580	231,90	544	180,58
70 a 79 anos	687	393,32	516	270,27
80 anos e +	465	635,16	372	437,62
<b>Total</b>	<b>2.672</b>	<b>-</b>	<b>2.623</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>42,07</b>	<b>-</b>	<b>39,41</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>53,37</b>	<b>-</b>	<b>46,67</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>42,38</b>	<b>-</b>	<b>37,53</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# RIO GRANDE DO SUL

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	201	15,20	154	7,23
5 a 9 anos	159	12,79	91	4,53
10 a 14 anos	127	9,95	90	4,32
15 a 19 anos	190	14,50	143	6,54
20 a 29 anos	404	36,23	352	9,47
30 a 39 anos	671	25,36	892	33,10
40 a 49 anos	2.169	109,92	1.900	94,08
50 a 59 anos	4.745	339,36	3.058	206,05
60 a 69 anos	6.151	719,56	3.701	376,44
70 a 79 anos	4.786	1.270,06	3.414	692,91
80 anos e +	1.655	1.738,03	1.679	1.009,75
<b>Total</b>	<b>21.258</b>	-	<b>15.474</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>108,40</b>	-	<b>77,52</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>163,73</b>	-	<b>94,86</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>129,66</b>	-	<b>76,04</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	121	5,52	111	5,26
5 a 9 anos	139	6,08	109	4,95
10 a 14 anos	131	5,35	81	3,44
15 a 19 anos	175	7,67	113	5,06
20 a 29 anos	375	9,56	337	8,52
30 a 39 anos	882	22,69	1.257	31,07
40 a 49 anos	2.884	96,28	3.030	96,84
50 a 59 anos	6.453	335,73	4.532	218,34
60 a 69 anos	9.835	779,76	6.243	411,38
70 a 79 anos	8.536	1.447,66	6.045	722,07
80 anos e +	3.884	2.181,73	4.198	1.253,90
<b>Total</b>	<b>33.415</b>	-	<b>26.056</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>139,32</b>	-	<b>105,06</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>168,29</b>	-	<b>101,25</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>131,10</b>	-	<b>80,86</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# RONDÔNIA

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	10	7,82	6	2,81
5 a 9 anos	5	4,26	2	1,02
10 a 14 anos	5	4,67	5	2,76
15 a 19 anos	11	12,17	4	2,56
20 a 29 anos	11	14,57	10	4,17
30 a 39 anos	24	13,51	22	14,48
40 a 49 anos	31	26,39	50	53,82
50 a 59 anos	82	107,50	59	108,52
60 a 69 anos	69	171,24	41	153,34
70 a 79 anos	49	397,37	24	261,01
80 anos e +	17	677,56	7	282,14
<b>Total</b>	<b>314</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>21,49</b>	<b>-</b>	<b>17,36</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>50,36</b>	<b>-</b>	<b>40,93</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>41,27</b>	<b>-</b>	<b>32,80</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	17	4,36	12	3,20
5 a 9 anos	11	2,78	8	2,10
10 a 14 anos	12	2,99	9	2,33
15 a 19 anos	17	4,63	9	2,53
20 a 29 anos	31	5,30	29	4,99
30 a 39 anos	49	10,38	90	20,44
40 a 49 anos	133	44,62	161	60,84
50 a 59 anos	238	135,08	208	141,28
60 a 69 anos	315	298,92	186	229,81
70 a 79 anos	291	664,84	131	416,82
80 anos e +	115	1.166,05	78	814,65
<b>Total</b>	<b>1.229</b>	<b>-</b>	<b>921</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>36,91</b>	<b>-</b>	<b>29,37</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>73,62</b>	<b>-</b>	<b>61,04</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>58,25</b>	<b>-</b>	<b>49,05</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# RORAIMA

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	1	4,64	2	5,38
5 a 9 anos	1	5,23	3	9,20
10 a 14 anos	-	-	1	3,58
15 a 19 anos	3	21,12	2	8,09
20 a 29 anos	2	14,64	1	2,54
30 a 39 anos	3	8,83	3	12,37
40 a 49 anos	5	25,27	7	50,62
50 a 59 anos	13	103,65	9	106,82
60 a 69 anos	11	174,55	12	269,48
70 a 79 anos	10	408,16	7	387,17
80 anos e +	3	469,48	3	427,35
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>20,66</b>	<b>-</b>	<b>23,22</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>47,90</b>	<b>-</b>	<b>54,95</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>38,90</b>	<b>-</b>	<b>43,21</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	5	5,42	4	4,45
5 a 9 anos	2	2,39	3	3,71
10 a 14 anos	2	2,44	5	6,22
15 a 19 anos	5	6,94	-	-
20 a 29 anos	7	5,88	7	6,18
30 a 39 anos	12	13,27	16	18,89
40 a 49 anos	25	41,53	37	76,07
50 a 59 anos	47	155,52	32	132,29
60 a 69 anos	57	355,05	35	260,44
70 a 79 anos	74	1.025,37	39	615,23
80 anos e +	34	1.752,13	20	1.029,07
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>41,11</b>	<b>-</b>	<b>32,12</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>96,38</b>	<b>-</b>	<b>72,73</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>76,65</b>	<b>-</b>	<b>58,58</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE



## SANTA CATARINA

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	79	11,03	76	6,60
5 a 9 anos	55	8,12	49	4,45
10 a 14 anos	53	7,64	50	4,42
15 a 19 anos	86	12,61	40	3,55
20 a 29 anos	182	33,95	116	6,73
30 a 39 anos	210	18,26	269	24,02
40 a 49 anos	618	77,61	521	66,83
50 a 59 anos	1.284	235,87	760	139,63
60 a 69 anos	1.636	499,12	857	252,00
70 a 79 anos	1.232	870,69	737	465,96
80 anos e +	385	1.109,16	298	626,14
<b>Total</b>	<b>5.820</b>	-	<b>3.773</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>62,02</b>	-	<b>40,89</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>114,27</b>	-	<b>64,38</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>90,94</b>	-	<b>51,77</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	77	6,30	51	4,33
5 a 9 anos	69	5,31	45	3,61
10 a 14 anos	52	3,89	48	3,73
15 a 19 anos	91	7,33	61	5,02
20 a 29 anos	201	9,14	207	9,48
30 a 39 anos	451	22,14	527	25,71
40 a 49 anos	1.133	80,09	1.155	81,95
50 a 59 anos	2.224	266,24	1.553	180,85
60 a 69 anos	3.315	639,55	1.827	315,50
70 a 79 anos	2.727	1.114,74	1.709	563,69
80 anos e +	1.182	1.671,22	956	882,84
<b>Total</b>	<b>11.522</b>	-	<b>8.139</b>	-
<b>Tx. Bruta</b>	-	<b>92,72</b>	-	<b>65,55</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	-	<b>134,91</b>	-	<b>80,21</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	-	<b>105,22</b>	-	<b>64,29</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# SÃO PAULO

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	644	13,85	546	7,26
5 a 9 anos	491	11,94	333	4,93
10 a 14 anos	354	9,07	296	4,56
15 a 19 anos	505	12,62	372	5,46
20 a 29 anos	1.186	30,35	1.001	7,90
30 a 39 anos	2.082	23,49	2.456	27,85
40 a 49 anos	5.808	92,30	5.326	84,63
50 a 59 anos	12.035	276,10	8.785	194,82
60 a 69 anos	14.737	597,43	9.900	359,07
70 a 79 anos	11.795	1.079,15	8.674	653,31
80 anos e +	4.266	1.536,60	3.959	933,43
<b>Total</b>	<b>53.903</b>	<b>-</b>	<b>41.648</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>83,97</b>	<b>-</b>	<b>64,69</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>137,97</b>	<b>-</b>	<b>88,63</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>109,64</b>	<b>-</b>	<b>70,74</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	187	2,40	414	5,51
5 a 9 anos	180	2,20	310	3,90
10 a 14 anos	152	1,73	355	4,13
15 a 19 anos	272	3,19	419	4,89
20 a 29 anos	568	3,64	1.279	8,11
30 a 39 anos	1.121	8,08	3.791	26,08
40 a 49 anos	3.499	34,37	8.420	79,29
50 a 59 anos	6.738	109,04	12.530	189,60
60 a 69 anos	9.980	252,08	17.083	368,98
70 a 79 anos	9.570	518,31	16.282	674,51
80 anos e +	4.905	895,59	10.801	1.183,62
<b>Total</b>	<b>37.172</b>	<b>-</b>	<b>71.684</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>43,43</b>	<b>-</b>	<b>81,36</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>58,59</b>	<b>-</b>	<b>90,77</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>46,08</b>	<b>-</b>	<b>72,47</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

## SERGIPE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1979 e 1983.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	10	3,59	8	1,75
5 a 9 anos	9	3,52	9	2,15
10 a 14 anos	6	2,52	12	3,01
15 a 19 anos	13	6,58	9	2,61
20 a 29 anos	13	10,06	14	2,99
30 a 39 anos	25	8,68	62	19,71
40 a 49 anos	72	35,96	111	48,58
50 a 59 anos	117	81,40	158	96,56
60 a 69 anos	149	136,98	144	122,08
70 a 79 anos	147	232,18	147	206,36
80 anos e +	40	240,85	51	230,33
<b>Total</b>	<b>601</b>	<b>-</b>	<b>725</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>20,90</b>	<b>-</b>	<b>24,12</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>34,86</b>	<b>-</b>	<b>35,33</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>28,14</b>	<b>-</b>	<b>28,83</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**

Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	27	5,58	22	4,68
5 a 9 anos	19	3,84	16	3,31
10 a 14 anos	16	3,11	16	3,14
15 a 19 anos	25	5,23	25	5,19
20 a 29 anos	42	5,77	41	5,34
30 a 39 anos	48	9,17	100	17,57
40 a 49 anos	113	32,00	189	49,70
50 a 59 anos	225	101,89	269	107,83
60 a 69 anos	281	207,58	294	172,26
70 a 79 anos	283	349,53	241	250,62
80 anos e +	166	455,29	171	372,29
<b>Total</b>	<b>1.245</b>	<b>-</b>	<b>1.384</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>30,05</b>	<b>-</b>	<b>32,08</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>46,41</b>	<b>-</b>	<b>43,57</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>36,61</b>	<b>-</b>	<b>35,18</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

# TOCANTINS

**Taxas de mortalidade por câncer, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000, segundo sexo e faixa etária, entre 1995 e 1999.**


Faixa etária	Homens		Mulheres	
	número de óbitos	taxa específica	número de óbitos	taxa específica
0 a 4 anos	6	1,75	12	3,65
5 a 9 anos	2	0,59	3	0,91
10 a 14 anos	5	1,40	2	0,58
15 a 19 anos	8	2,44	6	1,89
20 a 29 anos	14	2,92	12	2,58
30 a 39 anos	21	6,10	43	12,76
40 a 49 anos	63	25,80	91	40,26
50 a 59 anos	90	54,90	103	71,38
60 a 69 anos	134	129,01	114	127,63
70 a 79 anos	145	277,32	84	183,69
80 anos e +	77	405,11	51	255,19
<b>Total</b>	<b>565</b>	<b>-</b>	<b>521</b>	<b>-</b>
<b>Tx. Bruta</b>	<b>-</b>	<b>20,34</b>	<b>-</b>	<b>19,66</b>
<b>Tx padr. Mundial (1)</b>	<b>-</b>	<b>31,25</b>	<b>-</b>	<b>30,95</b>
<b>Tx padr. BR (2)</b>	<b>-</b>	<b>24,80</b>	<b>-</b>	<b>24,79</b>

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE

TAXAS DE MORTALIDADE DAS 5 LOCALIZAÇÕES  
PRIMÁRIAS DE CÂNCER MAIS FREQUENTES EM 1999,  
AJUSTADAS POR IDADE PELA POPULAÇÃO PADRÃO  
MUNDIAL, POR 100.000 HOMENS E POR  
100.000 MULHERES, ENTRE 1979 E 1999.

# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# ACRE

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# BAHIA

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# CEARÁ

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

## ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# GOIÁS

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# MARANHÃO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




# MATO GROSSO

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


## MATO GROSSO DO SUL

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# PARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# PARAÍBA

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# PARANÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# PERNAMBUCO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# PIAUI

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

## RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# RIO GRANDE DO SUL

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# RONDÔNIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

## SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# SÃO PAULO

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais freqüentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


# SERGIPE

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 homens, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 1999, ajustadas por idade pela população mundial<sup>(1)</sup>, por 100.000 mulheres, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



# TOCANTINS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

TAXAS DE MORTALIDADE POR CÂNCER, BRUTAS  
E AJUSTADAS POR IDADE PELAS POPULAÇÕES  
MUNDIAL E BRASILEIRA, POR 100.000 HOMENS E  
POR 100.000 MULHERES, ENTRE 1995 E 1999.

## Taxas de mortalidade por todas as neoplasias, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	2,93	2,39	2,97	1,95	7,29	13,97	32,69	107,79	215,08	452,76	550,32	29,92	25	51,64	40,96
Alagoas	3,11	2,56	3,19	3,72	4,57	12,15	29,56	80,67	164,51	283,97	411,03	25,53	21	38,39	30,66
Amapá	7,00	6,71	2,24	4,23	9,58	15,98	54,93	121,68	432,97	797,41	1428,75	40,46	19	91,61	72,30
Amazonas	3,27	3,60	2,22	5,23	5,97	14,86	48,49	139,69	323,62	560,94	853,40	34,87	17	70,57	55,50
Bahia	2,60	2,29	2,21	3,20	4,79	10,55	33,89	94,50	205,48	383,81	555,45	33,44	11	47,09	37,21
Ceará	5,60	4,04	3,37	4,97	7,14	13,18	42,76	110,26	231,66	417,40	707,30	42,44	16	55,42	44,23
Distrito Federal	5,48	4,10	5,85	8,77	10,31	17,91	64,94	207,84	580,75	1318,20	2225,07	64,80	8	135,13	106,61
Espírito Santo	5,27	4,35	4,30	7,92	6,96	16,60	62,34	191,16	433,10	855,75	1326,08	69,09	5	99,21	78,10
Goias	4,76	4,52	4,01	5,42	7,09	14,67	51,93	150,11	363,77	723,58	1231,54	55,37	12	84,00	66,40
Maranhão	1,74	1,33	1,34	2,22	2,99	7,38	16,68	43,90	93,02	150,55	204,59	14,05	27	21,05	16,82
Mato Grosso	4,88	3,90	4,68	3,88	6,63	13,63	46,20	145,12	339,78	713,26	1167,53	45,73	14	79,90	63,14
Mato Grosso do Sul	6,22	4,77	4,27	6,13	9,53	17,59	62,52	187,52	435,04	799,76	1383,86	68,25	7	98,46	77,70
Minas Gerais	4,75	4,08	3,57	5,96	7,28	15,87	57,85	169,80	390,60	768,45	1282,84	68,52	9	90,35	71,32
Pará	3,32	2,75	2,25	3,75	5,51	10,16	31,38	89,23	215,26	415,56	569,83	26,90	18	48,35	38,17
Paraíba	2,96	2,07	3,41	2,62	4,52	9,16	26,13	54,06	130,71	180,29	289,30	23,89	20	28,38	22,74
Paraná	5,50	5,36	4,67	6,97	8,95	20,57	79,82	232,33	557,66	1094,58	1762,08	91,35	4	126,13	99,19
Pernambuco	4,58	3,40	3,66	5,02	6,82	16,76	49,29	127,28	281,08	503,54	774,52	49,07	10	64,67	51,36
Piauí	1,31	1,90	1,54	2,05	4,09	7,55	25,10	61,64	135,48	251,45	299,51	21,77	23	30,81	24,38
Rio de Janeiro	6,17	5,43	5,48	7,20	8,53	21,24	79,73	245,80	594,47	1125,30	1876,45	111,33	1	132,17	103,79
Rio Grande do Norte	5,16	3,32	3,60	6,33	5,70	11,19	42,84	108,27	231,90	393,32	635,16	42,54	13	53,37	42,38
Rio Grande do Sul	5,52	6,08	5,35	7,67	9,56	22,69	96,28	335,73	779,76	1447,66	2181,73	139,47	3	168,29	131,10
Rondônia	4,36	2,78	2,99	4,63	5,30	10,38	44,62	135,08	298,92	664,84	1166,05	38,07	24	73,62	58,25
Roraima	5,42	2,39	2,44	6,94	5,88	13,27	41,53	155,52	355,05	1025,37	1752,13	41,23	22	96,38	76,65
Santa Catarina	6,30	5,31	3,89	7,33	9,14	22,14	80,09	266,24	639,55	1114,74	1671,22	92,97	6	134,91	105,22
São Paulo	6,18	5,53	4,81	7,75	9,03	21,05	82,80	265,63	614,83	1216,27	2056,11	104,47	2	140,33	110,28
Sergipe	5,58	3,84	3,11	5,23	5,77	9,17	32,00	101,89	207,58	349,53	455,29	32,65	15	46,41	36,61
Tocantins	1,75	0,59	1,40	2,24	2,92	6,10	25,80	54,90	129,01	277,32	405,11	20,64	26	31,25	24,80

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por todas as neoplasias, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	2,38	3,68	0,60	3,26	5,92	26,58	41,87	112,57	165,93	305,65	349,60	25,16	25	44,57	36,24
Alagoas	2,43	1,48	2,13	3,80	4,60	19,43	49,03	85,65	140,74	230,93	314,89	27,43	18	37,56	30,63
Amapá	8,67	5,39	2,23	9,70	6,32	25,25	82,92	132,79	269,52	309,90	867,56	34,28	6	65,44	53,18
Amazonas	4,62	2,54	2,86	4,68	9,61	23,02	79,83	142,02	248,98	421,59	537,62	34,23	23	63,60	51,21
Bahia	2,37	1,81	1,80	2,22	4,49	15,86	44,57	93,39	156,62	248,29	376,78	30,95	11	39,38	31,67
Ceará	4,20	3,37	2,93	2,71	5,58	18,20	58,21	109,74	189,35	300,42	408,58	39,43	9	47,64	38,33
Distrito Federal	5,63	3,52	2,60	7,34	7,78	28,54	75,63	197,89	399,06	828,30	1118,98	57,15	15	97,45	77,44
Espírito Santo	3,39	3,01	2,78	4,65	7,01	23,24	66,73	147,24	263,36	475,57	795,58	53,46	10	67,20	53,99
Goias	4,88	2,48	3,47	3,74	6,67	22,52	61,42	149,69	266,54	441,81	734,99	45,96	13	65,36	52,29
Maranhão	1,16	1,19	0,87	1,44	2,78	11,31	31,12	51,07	81,34	106,62	130,53	14,31	27	20,79	16,91
Mato Grosso	4,28	2,51	2,90	4,15	4,86	23,97	69,05	138,12	234,50	392,10	597,64	34,88	19	59,92	48,21
Mato Grosso do Sul	5,84	4,20	3,31	4,45	7,43	24,25	81,36	170,74	300,60	569,21	1057,08	56,73	8	79,74	64,13
Minas Gerais	4,33	3,23	3,07	3,95	5,73	20,91	61,29	140,80	261,03	476,86	800,34	57,98	7	65,51	52,45
Pará	3,12	1,90	1,92	2,53	5,13	18,26	53,15	100,87	165,90	288,62	458,27	26,92	21	44,29	35,83
Paraíba	2,59	1,90	2,27	2,72	4,78	9,19	35,76	62,22	98,56	137,01	183,11	23,12	20	25,55	20,71
Paraná	5,40	4,07	3,04	4,85	7,79	27,13	81,27	183,72	345,70	642,79	1041,39	69,26	4	86,45	69,12
Pernambuco	4,00	2,29	2,92	3,77	7,62	24,45	68,61	137,78	234,26	364,40	599,38	50,84	5	59,42	47,95
Piauí	1,90	1,82	1,12	1,93	2,15	10,64	31,49	66,50	109,01	164,19	206,49	20,04	26	26,69	21,35
Rio de Janeiro	5,75	4,56	4,11	4,57	8,04	29,79	88,71	194,73	361,74	646,23	1069,62	95,48	1	90,37	72,36
Rio Grande do Norte	5,17	3,81	2,85	3,49	5,18	17,37	50,49	122,22	180,58	270,27	437,62	40,04	12	46,67	37,53
Rio Grande do Sul	5,26	4,95	3,44	5,06	8,52	31,07	96,84	218,34	411,38	722,07	1253,90	105,11	3	101,25	80,86
Rondônia	3,20	2,10	2,33	2,53	4,99	20,44	60,84	141,28	229,81	416,82	814,65	30,36	17	61,04	49,05
Roraima	4,45	3,71	6,22	0,00	6,18	18,89	76,07	132,29	260,44	615,23	1029,07	32,29	24	72,73	58,58
Santa Catarina	4,33	3,61	3,73	5,02	9,48	25,71	81,95	180,85	315,50	563,69	882,84	65,60	14	80,21	64,29
São Paulo	5,51	3,90	4,13	4,89	8,11	26,08	79,29	189,60	368,98	674,51	1183,62	81,39	2	90,77	72,47
Sergipe	4,68	3,31	3,14	5,19	5,34	17,57	49,70	107,83	172,26	250,62	372,29	34,82	16	43,57	35,18
Tocantins	3,65	0,91	0,58	1,89	2,58	12,76	40,26	71,38	127,63	183,69	255,19	20,30	22	30,95	24,79

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de boca, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	1,63	0,00	14,15	13,10	0,47	25	0,78	0,65	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	1,78	2,49	6,71	5,55	11,63	0,81	21	1,25	0,98	
Amapá	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,76	2,55	2,25	12,86	0,00	21,65	0,89	19	1,79	1,41	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	2,62	6,65	9,48	7,53	12,02	0,96	17	1,95	1,49	
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,48	2,96	8,21	11,93	15,04	15,65	1,76	11	2,60	2,00	
Ceará	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,61	2,03	3,53	6,39	8,87	14,12	1,12	16	1,51	1,20	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,29	4,29	14,68	23,14	16,77	34,23	2,36	8	4,35	3,30	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,26	0,08	0,64	7,81	15,40	21,82	31,30	33,15	3,72	5	5,23	4,07	
Goias	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,46	2,41	8,88	10,82	12,20	23,15	1,75	12	2,55	1,98	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,75	1,25	2,45	0,76	1,05	0,27	27	0,44	0,34	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,15	0,00	0,09	0,33	2,36	4,23	10,45	21,51	7,81	1,30	14	2,19	1,68	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,19	0,11	0,95	3,70	10,52	15,84	24,90	21,29	2,53	7	3,61	2,81	
Minas Gerais	0,02	0,00	0,02	0,02	0,07	0,65	3,78	9,18	14,56	15,44	21,08	2,36	9	3,07	2,37	
Pará	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,39	1,06	4,96	6,73	13,36	15,87	0,92	18	1,66	1,29	
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,42	3,58	4,57	6,86	3,96	0,82	20	1,07	0,82	
Paraná	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,96	6,89	15,67	22,37	29,62	38,26	3,89	4	5,20	4,04	
Pernambuco	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,34	3,44	8,52	12,09	15,61	20,37	2,00	10	2,75	2,12	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,88	2,29	6,83	4,16	3,63	0,62	23	0,97	0,71	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,14	7,95	21,29	30,24	29,58	31,90	5,54	1	6,35	4,87	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	4,14	5,03	8,80	14,31	15,03	1,62	13	2,19	1,72	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,77	6,24	16,23	22,75	19,84	24,15	4,11	3	4,77	3,67	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	1,34	2,84	1,90	6,85	20,28	0,52	24	0,98	0,80	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	6,62	6,23	13,86	0,00	0,76	22	1,65	1,24	
Santa Catarina	0,00	0,08	0,00	0,08	0,09	0,79	5,87	13,77	20,06	28,21	43,83	3,41	6	4,76	3,71	
São Paulo	0,01	0,01	0,02	0,01	0,06	0,86	7,78	20,29	28,06	31,52	36,70	4,77	2	6,16	4,73	
Sergipe	0,21	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	2,83	7,25	7,39	7,41	5,49	1,21	15	1,85	1,43	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,66	0,96	5,74	5,26	0,47	26	0,72	0,57	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de boca, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,16	25	0,26	0,24	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,49	0,74	1,84	5,62	7,91	0,39	18	0,53	0,43
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	2,76	2,51	8,69	10,00	31,55	0,80	6	1,78	1,39
Amazonas	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,21	1,10	1,81	2,50	6,48	0,21	23	0,42	0,33	
Bahia	0,00	0,03	0,00	0,03	0,04	0,12	0,64	2,16	2,92	5,90	11,43	0,62	11	0,79	0,62	
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,17	0,54	1,36	2,56	6,09	15,28	0,63	9	0,73	0,59	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,19	4,22	3,41	4,69	3,74	0,47	15	0,83	0,63	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,28	2,72	5,59	17,68	0,63	10	0,79	0,63	
Goias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	0,67	1,63	3,50	5,33	14,52	0,55	13	0,80	0,64	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	1,03	1,11	0,00	0,09	27	0,15	0,11	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,76	0,33	3,64	7,34	8,02	0,38	19	0,71	0,55	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,39	2,59	4,14	8,71	11,19	0,65	8	0,98	0,76	
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,18	0,60	1,14	2,87	6,08	14,89	0,67	7	0,74	0,60	
Pará	0,00	0,06	0,00	0,06	0,08	0,11	0,17	0,85	2,08	3,77	6,99	0,27	21	0,46	0,37	
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,12	0,81	1,59	1,77	5,75	0,30	20	0,32	0,25	
Paraná	0,04	0,00	0,00	0,09	0,05	0,22	0,98	2,02	4,75	7,17	22,57	0,88	4	1,12	0,89	
Pernambuco	0,11	0,00	0,00	0,05	0,15	0,15	0,47	1,83	3,75	7,93	15,43	0,81	5	0,93	0,74	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,23	1,36	1,27	1,46	0,14	26	0,21	0,16	
Rio de Janeiro	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10	0,34	1,25	2,95	4,47	7,76	23,93	1,36	1	1,27	1,02	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,32	0,68	2,66	6,29	12,94	0,56	12	0,62	0,49	
Rio Grande do Sul	0,09	0,05	0,00	0,04	0,18	0,15	0,74	2,12	3,43	5,61	11,95	0,90	3	0,87	0,70	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	2,04	6,18	3,18	31,33	0,43	17	1,07	0,83	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00	0,16	24	0,47	0,37	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	1,63	2,76	4,95	13,85	0,55	14	0,69	0,54	
São Paulo	0,01	0,00	0,01	0,02	0,03	0,17	0,70	1,92	4,13	8,70	18,74	0,92	2	1,02	0,81	
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,18	0,79	0,80	2,34	2,08	6,53	0,43	16	0,50	0,40	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	4,37	10,01	0,23	22	0,31	0,25	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de cólo do útero, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	6,64	13,28	10,39	20,03	41,95	64,74	4,13	15	6,85	5,86
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	2,07	7,98	9,38	8,47	18,25	22,15	2,51	26	3,47	2,88
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	7,89	24,88	40,09	43,47	29,99	94,64	6,74	1	12,77	10,50
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	8,41	23,44	29,21	44,01	47,54	25,91	6,53	2	11,55	9,48
Bahia	0,00	0,45	0,00	0,00	0,37	2,36	7,04	11,45	14,97	14,94	14,62	2,97	23	3,91	3,17
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,10	0,40	2,51	6,93	10,13	11,35	16,79	13,31	2,88	24	3,55	2,92
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,89	10,62	18,63	26,60	51,57	41,17	4,53	12	7,21	5,75
Espírito Santo	0,00	0,00	0,13	0,13	1,01	4,15	11,85	21,98	22,02	29,80	39,78	5,64	4	6,92	5,66
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,43	9,08	20,70	28,64	29,55	42,23	5,09	9	6,89	5,54
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	3,62	10,82	13,65	15,41	17,40	16,21	3,28	19	4,81	3,98
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,16	0,65	4,61	13,16	23,41	26,66	29,37	48,13	4,79	10	7,59	6,18
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	4,69	14,22	18,11	20,18	34,83	41,95	5,30	8	6,90	5,72
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,02	0,35	2,36	6,51	10,39	13,84	15,73	24,34	3,31	18	3,74	3,05
Pará	0,00	0,00	0,11	0,00	0,84	5,08	14,29	17,83	20,59	24,99	30,95	4,19	14	6,57	5,47
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,37	4,15	5,38	5,00	4,97	8,21	1,82	27	1,79	1,50
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,04	0,77	4,76	12,14	20,28	21,75	25,27	36,54	5,60	5	6,63	5,45
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,05	0,81	4,54	12,02	17,53	20,99	26,80	29,45	5,33	7	6,27	5,16
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2,40	7,00	11,08	13,63	13,95	26,36	2,85	25	3,80	3,10
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,03	0,03	0,84	3,97	9,44	14,21	17,60	23,28	31,14	5,57	6	5,27	4,36
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2,81	8,39	15,39	12,61	17,28	27,06	3,80	17	4,54	3,75
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	5,46	13,71	17,58	19,11	19,35	22,70	6,41	3	6,22	5,22
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	4,09	9,45	20,38	13,59	25,45	20,89	3,21	20	5,46	4,51
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	4,72	12,34	16,54	14,88	15,78	51,45	3,08	21	5,71	4,83
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	4,39	11,71	16,77	15,20	14,51	19,39	4,68	11	5,35	4,49
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2,58	7,93	13,85	16,67	22,16	30,79	4,30	13	4,71	3,82
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	4,39	9,20	18,04	13,48	22,88	21,77	4,00	16	5,19	4,31
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2,97	8,85	9,70	15,67	19,68	25,02	2,98	22	4,37	3,61

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,92	1,63	2,53	9,43	13,10	0,63	23	1,05	0,88	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	0,36	1,38	1,79	10,31	3,88	0,46	26	0,70	0,57	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,28	0,00	8,57	0,00	0,00	0,50	25	0,92	0,72	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,77	1,41	5,25	5,93	12,55	24,04	0,93	17	1,81	1,46	
Bahia	0,00	0,00	0,02	0,13	0,17	0,61	1,57	3,70	9,83	15,04	22,40	1,39	15	2,00	1,57	
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,57	1,36	3,13	5,23	12,23	22,72	1,16	16	1,51	1,22	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,20	0,00	0,21	1,44	4,07	12,05	33,93	75,45	136,93	3,65	6	7,81	6,14	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	1,28	3,25	8,61	19,84	32,01	53,87	2,98	8	4,26	3,35	
Goiás	0,08	0,00	0,00	0,16	0,32	0,91	2,25	6,76	15,68	36,11	52,47	2,46	10	3,77	2,98	
Maranhão	0,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,14	1,03	2,08	5,11	8,34	4,22	0,64	22	1,00	0,77	
Mato Grosso	0,15	0,00	0,00	0,16	0,36	0,55	1,85	4,51	15,92	23,89	35,14	1,69	12	2,97	2,31	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1,35	2,92	7,74	22,27	46,68	54,75	3,30	7	4,81	3,78	
Minas Gerais	0,00	0,02	0,02	0,07	0,25	1,21	2,94	6,75	13,89	31,42	53,65	2,77	9	3,61	2,89	
Pará	0,00	0,05	0,00	0,00	0,24	0,61	1,06	3,48	7,40	11,87	17,19	0,89	18	1,60	1,27	
Paraíba	0,11	0,00	0,00	0,00	0,15	0,31	0,71	1,99	4,57	6,05	9,91	0,79	19	0,94	0,74	
Paraná	0,00	0,00	0,08	0,13	0,32	1,40	4,34	11,72	27,80	62,83	95,65	4,76	4	6,60	5,20	
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,86	1,75	4,66	9,03	16,06	26,73	1,62	13	2,15	1,71	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,51	0,53	3,06	3,80	9,70	10,89	0,79	20	1,11	0,89	
Rio de Janeiro	0,03	0,00	0,03	0,06	0,82	2,01	5,09	12,90	37,50	87,51	132,65	7,35	2	8,73	6,90	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,14	0,36	0,82	2,34	2,38	12,39	14,89	32,78	1,81	11	2,31	1,84	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,04	0,13	0,33	1,88	5,44	15,92	39,72	85,98	145,49	7,63	1	9,19	7,23	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21	2,01	1,70	1,90	9,14	40,56	0,65	21	1,26	1,07	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	18,69	0,00	0,00	0,61	24	1,61	1,09	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,16	0,50	2,21	2,83	10,18	25,27	44,97	93,32	3,95	5	5,67	4,52	
São Paulo	0,00	0,01	0,03	0,06	0,42	1,50	5,17	14,11	39,53	86,87	145,16	6,61	3	8,97	7,04	
Sergipe	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,13	6,34	11,08	16,06	24,68	1,46	14	2,28	1,75	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,22	5,78	1,91	5,26	0,43	27	0,72	0,53	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	1,02	0,00	0,00	5,99	25,90	0,42	27	0,63	0,57	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,11	1,47	2,47	6,63	8,42	7,91	0,84	21	1,23	0,95	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	13,04	29,99	15,77	0,84	20	2,20	1,63	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,91	4,44	7,67	11,45	28,77	45,34	1,85	13	3,52	2,83	
Bahia	0,00	0,00	0,02	0,03	0,18	0,97	2,22	4,77	10,59	18,34	27,39	1,91	12	2,41	1,92	
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,43	1,61	2,55	7,32	10,71	25,14	1,34	18	1,59	1,26	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10	2,01	4,55	11,95	28,65	51,57	119,76	3,85	7	6,64	5,28	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,13	0,26	0,23	1,77	3,86	6,40	21,42	36,63	83,98	3,85	6	4,76	3,82	
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,08	0,27	0,87	3,00	7,08	14,43	32,46	58,06	2,58	11	3,72	2,96	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,19	1,35	2,10	2,88	5,92	5,97	0,56	25	0,84	0,67	
Mato Grosso	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,94	3,43	4,68	11,51	26,43	32,09	1,60	15	2,90	2,31	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,56	4,15	9,70	11,90	39,18	89,49	3,34	9	4,57	3,76	
Minas Gerais	0,00	0,02	0,02	0,11	0,31	1,27	3,36	7,80	14,88	32,67	65,45	3,62	8	4,00	3,21	
Pará	0,05	0,00	0,00	0,12	0,32	0,34	1,74	5,09	12,03	19,34	36,94	1,49	16	2,57	2,01	
Paraíba	0,00	0,11	0,00	0,00	0,21	1,00	0,49	1,79	4,31	6,74	7,39	0,91	19	0,96	0,80	
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	2,28	4,80	9,65	22,75	58,09	104,25	4,97	4	6,15	4,95	
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,14	0,26	0,76	3,21	6,16	12,10	23,78	43,95	2,68	10	3,09	2,46	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,11	0,64	2,08	3,75	10,78	8,79	0,71	24	0,96	0,75	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,03	0,03	0,34	1,89	5,49	13,41	30,52	62,85	126,03	8,08	2	7,43	5,90	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,86	2,37	3,85	7,97	11,52	28,23	1,73	14	1,96	1,59	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,08	0,22	0,35	1,80	5,40	12,24	31,37	71,19	143,07	8,43	1	7,81	6,22	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,89	2,72	6,18	25,45	10,44	0,80	23	1,80	1,40	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	31,55	102,91	0,83	22	2,22	1,92	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,08	0,00	0,82	1,07	4,12	10,60	20,55	49,48	99,73	4,63	5	5,64	4,51	
São Paulo	0,00	0,00	0,01	0,05	0,29	1,73	5,36	13,24	32,23	72,08	140,82	7,22	3	7,92	6,28	
Sergipe	0,21	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	1,31	3,61	6,45	17,68	21,77	1,42	17	1,77	1,40	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1,39	5,60	13,12	0,00	0,54	26	0,96	0,71	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de encéfalo, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,67	0,96	0,00	2,53	0,00	0,00	0,32	27	0,45	0,40	
Alagoas	0,36	0,24	0,71	0,77	0,44	0,76	1,42	5,25	4,02	5,55	3,88	1,12	22	1,49	1,27	
Amapá	0,70	2,24	0,00	0,00	1,06	0,76	2,55	2,25	12,86	10,49	21,65	1,49	16	2,51	2,07	
Amazonas	0,35	0,37	0,37	0,80	0,63	1,15	2,01	2,45	10,67	7,53	4,01	1,19	19	1,90	1,57	
Bahia	0,38	0,30	0,49	0,54	0,65	1,06	1,32	1,88	3,70	2,95	2,49	0,93	24	1,10	0,98	
Ceará	0,81	0,71	0,43	0,69	1,04	1,42	2,44	4,41	6,97	5,27	7,37	1,65	13	2,01	1,74	
Distrito Federal	1,26	0,86	2,02	1,75	0,97	1,88	3,86	9,04	16,97	14,67	20,54	2,80	5	4,07	3,42	
Espírito Santo	0,57	1,32	0,98	1,02	0,55	1,09	2,73	6,34	10,25	14,94	10,36	2,18	10	2,77	2,32	
Goiás	0,75	0,66	0,71	0,72	0,91	1,66	4,41	6,76	13,91	16,10	13,89	2,59	6	3,36	2,78	
Maranhão	0,36	0,39	0,27	0,12	0,33	0,55	0,84	1,25	2,45	1,90	3,16	0,56	26	0,71	0,62	
Mato Grosso	0,92	1,50	1,17	0,62	0,73	1,55	2,53	5,92	8,95	11,95	11,71	2,00	11	2,66	2,28	
Mato Grosso do Sul	0,38	0,18	0,53	0,38	0,57	0,95	2,92	1,86	5,44	11,41	6,08	1,32	17	1,65	1,41	
Minas Gerais	0,80	0,80	0,75	0,79	0,85	1,54	3,54	6,55	11,35	12,87	17,24	2,49	8	3,00	2,52	
Pará	0,47	0,22	0,37	0,66	0,75	1,62	1,96	4,15	4,04	4,45	2,64	1,15	21	1,54	1,36	
Paraíba	0,77	0,41	0,68	0,21	0,74	1,22	1,70	3,38	4,85	3,23	3,96	1,26	18	1,46	1,28	
Paraná	1,12	1,01	0,86	0,43	0,94	2,21	2,88	6,52	10,85	15,23	12,04	2,52	7	3,04	2,57	
Pernambuco	0,72	0,77	0,54	0,62	0,78	1,63	2,96	4,83	6,38	7,81	7,64	1,76	12	2,13	1,85	
Piauí	0,53	0,12	0,22	0,36	1,02	0,51	2,98	3,31	4,55	4,85	3,63	1,16	20	1,51	1,28	
Rio de Janeiro	1,18	1,39	1,15	0,88	0,87	2,37	4,08	8,05	14,69	21,11	17,63	3,59	2	3,94	3,31	
Rio Grande do Norte	0,42	0,93	0,39	0,42	0,54	1,65	3,06	5,82	6,40	4,58	4,10	1,64	14	2,02	1,73	
Rio Grande do Sul	1,41	1,35	1,18	0,75	1,05	2,21	5,14	11,50	18,63	22,56	17,98	4,21	1	4,72	3,89	
Rondônia	1,03	0,51	0,25	0,27	0,51	0,21	1,34	2,84	5,69	6,85	10,14	0,96	23	1,45	1,19	
Roraima	1,08	1,20	0,00	1,39	0,84	3,32	4,98	3,31	12,46	27,71	0,00	2,29	9	3,51	3,00	
Santa Catarina	0,98	0,92	0,82	0,89	1,05	2,21	3,75	10,42	14,47	16,76	16,97	3,09	4	3,87	3,22	
São Paulo	1,26	1,20	0,82	0,94	0,99	2,39	4,34	9,34	16,37	22,53	18,99	3,53	3	4,25	3,53	
Sergipe	0,41	0,61	1,17	1,05	0,41	1,34	2,27	4,53	5,17	3,71	8,23	1,56	15	1,77	1,57	
Tocantins	0,29	0,00	0,28	0,00	0,63	1,45	1,23	1,22	1,93	1,91	0,00	0,65	25	0,78	0,73	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de encéfalo, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,73	8,58	11,99	0,00	0,89	23	1,46	1,19	
Alagoas	0,24	0,37	0,47	0,63	0,66	1,15	0,65	2,72	5,53	7,72	3,16	1,12	17	1,38	1,19	
Amapá	1,45	1,54	0,00	0,81	1,05	0,00	0,00	2,51	8,69	0,00	15,77	1,11	18	1,56	1,29	
Amazonas	0,83	0,89	0,37	0,53	0,99	0,52	1,48	4,38	4,82	6,26	9,72	1,16	16	1,68	1,44	
Bahia	0,42	0,45	0,32	0,37	0,52	1,06	0,91	2,02	3,36	3,80	4,79	0,91	22	1,05	0,93	
Ceará	0,44	0,64	0,58	0,26	0,50	1,06	2,03	2,47	4,15	5,04	3,45	1,18	15	1,34	1,17	
Distrito Federal	1,30	1,32	0,40	1,40	0,19	1,26	1,90	5,27	9,55	12,50	18,71	1,76	9	2,56	2,15	
Espírito Santo	0,59	0,82	0,63	0,13	0,70	2,03	2,45	4,91	9,65	10,55	13,26	2,06	6	2,44	2,06	
Goiás	1,31	0,34	0,81	0,48	0,66	1,53	2,50	5,86	7,87	11,63	11,88	1,93	8	2,44	2,06	
Maranhão	0,18	0,28	0,16	0,06	0,23	0,38	0,63	1,18	1,85	1,85	2,56	0,42	26	0,55	0,47	
Mato Grosso	0,95	0,78	0,30	0,64	0,28	0,94	2,86	5,02	7,27	8,81	4,01	1,41	12	2,04	1,69	
Mato Grosso do Sul	0,58	0,76	0,55	0,00	0,34	0,65	1,97	2,91	4,66	4,35	0,00	1,02	19	1,28	1,08	
Minas Gerais	0,68	0,89	0,60	0,43	0,53	1,19	2,81	5,07	8,01	12,08	12,38	2,09	5	2,33	1,95	
Pará	0,60	0,33	0,22	0,18	0,52	0,68	2,18	3,11	4,86	6,60	7,99	1,00	20	1,47	1,23	
Paraíba	0,67	0,53	0,40	0,42	0,55	0,55	1,46	4,07	5,00	4,97	0,82	1,24	14	1,41	1,18	
Paraná	0,58	1,18	0,38	0,56	0,65	1,18	2,46	4,52	8,22	12,07	11,28	1,93	7	2,27	1,91	
Pernambuco	0,68	0,44	0,64	0,33	0,58	0,87	1,61	2,35	5,46	6,23	6,55	1,29	13	1,45	1,24	
Piauí	0,27	0,73	0,11	0,36	0,26	0,23	0,95	1,15	2,04	2,54	4,39	0,59	25	0,70	0,61	
Rio de Janeiro	1,00	1,47	0,95	0,72	0,76	1,63	2,75	5,76	9,96	15,19	14,61	2,95	3	2,88	2,45	
Rio Grande do Norte	0,86	1,36	0,39	0,56	0,60	0,76	1,58	4,30	8,63	7,33	5,88	1,71	10	1,97	1,63	
Rio Grande do Sul	0,76	1,27	0,59	0,58	0,71	1,66	3,61	7,13	11,99	15,05	16,13	3,19	1	3,16	2,63	
Rondônia	0,80	0,53	0,52	0,56	0,34	1,14	1,51	2,04	3,71	9,55	10,44	0,98	21	1,45	1,27	
Roraima	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	7,44	0,00	51,45	0,81	24	1,51	1,31	
Santa Catarina	0,76	0,80	0,54	0,41	1,10	1,85	3,41	7,22	10,02	11,21	13,85	2,50	4	2,89	2,44	
São Paulo	1,04	1,02	0,90	0,55	1,05	1,77	3,18	6,66	12,40	18,56	18,08	3,03	2	3,32	2,78	
Sergipe	0,43	1,24	0,59	0,83	0,65	1,05	1,84	3,61	5,27	4,16	2,18	1,49	11	1,59	1,40	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,89	0,44	1,39	0,00	4,37	0,00	0,42	27	0,50	0,48	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de esôfago, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	5,06	4,72	0,00	0,47	26	0,94	0,68
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	1,60	6,08	10,73	14,28	15,51	1,27	18	2,10	1,59
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	3,83	2,25	8,57	31,48	0,00	1,19	20	2,48	2,04
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	2,21	6,65	9,48	13,80	8,01	0,99	22	2,05	1,56
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	2,46	8,69	12,19	20,05	18,14	1,88	14	2,76	2,11
Ceará	0,10	0,05	0,00	0,00	0,11	0,28	2,85	7,15	16,11	21,10	23,95	2,18	13	3,05	2,33
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,72	5,14	19,58	28,54	50,30	54,77	3,38	9	6,55	5,04
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	6,77	20,38	38,02	63,31	82,88	5,56	7	8,13	6,25
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,46	4,08	10,20	21,87	29,28	35,50	2,78	10	4,26	3,26
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,80	3,27	3,79	2,11	0,33	27	0,55	0,40
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,33	4,22	10,71	20,89	33,45	35,14	2,50	11	4,34	3,32
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,41	5,45	13,92	28,21	36,31	57,79	3,81	8	5,62	4,30
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	1,06	6,55	21,23	33,74	52,11	70,90	5,61	6	7,47	5,76
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	1,14	3,75	6,95	8,90	17,19	0,76	24	1,42	1,09
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,31	0,99	2,78	9,42	10,08	16,84	1,25	19	1,55	1,18
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,70	9,04	26,89	57,82	82,51	91,40	7,94	2	11,04	8,38
Pernambuco	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,39	2,78	7,29	15,81	21,19	28,00	2,22	12	3,07	2,35
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,23	3,57	7,59	7,62	5,45	0,86	23	1,30	0,97
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,84	5,78	18,40	34,66	47,74	61,29	5,88	5	6,93	5,29
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,24	0,90	5,56	9,60	18,32	17,76	1,56	16	2,05	1,57
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	1,11	11,55	42,14	75,72	99,21	132,57	12,43	1	14,93	11,34
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,67	10,78	15,18	31,99	60,84	1,82	15	3,73	2,89
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	3,31	12,46	41,57	0,00	1,37	17	3,01	2,31
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,88	7,85	29,45	59,81	81,35	91,90	7,66	3	11,26	8,52
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,73	7,48	25,89	43,93	57,79	71,76	6,63	4	8,85	6,73
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,19	0,85	5,43	10,34	9,88	5,49	1,06	21	1,71	1,27
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	4,27	3,85	7,65	0,00	0,61	25	0,97	0,74

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de esôfago, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	27	0,12	0,11
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,49	1,23	3,32	6,32	6,33	0,45	18	0,67	0,51
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	15,77	0,50	16	0,74	0,68
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,42	2,19	0,60	10,01	6,48	0,33	22	0,67	0,53
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,67	2,06	3,21	4,98	11,70	0,60	15	0,77	0,60
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,30	1,53	3,66	10,29	12,81	0,75	13	0,88	0,68
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,33	5,27	10,91	31,26	18,71	1,31	9	2,54	1,93
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,44	1,03	4,69	12,67	20,49	36,83	1,90	4	2,48	1,92
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,75	3,00	8,09	12,60	13,20	0,94	10	1,46	1,10
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,09	0,39	1,03	2,22	3,41	0,17	26	0,23	0,19
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,01	4,85	8,81	28,08	0,65	14	1,29	1,02
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,79	4,85	10,87	17,41	33,56	1,43	7	2,18	1,68
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,08	1,37	4,84	11,33	20,25	32,94	2,04	3	2,35	1,81
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	0,85	1,62	2,83	11,98	0,25	25	0,43	0,35
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	0,24	0,98	1,59	4,97	4,93	0,43	19	0,45	0,35
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16	1,72	8,80	17,27	24,90	36,54	2,54	2	3,34	2,53
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,39	5,67	8,11	16,83	0,87	11	1,03	0,79
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	0,46	2,04	7,61	1,46	0,33	21	0,46	0,35
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	1,07	3,39	7,64	15,35	23,51	1,78	6	1,68	1,30
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,79	1,36	3,32	6,81	14,12	0,75	12	0,83	0,67
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	2,21	9,01	16,61	30,46	55,26	3,87	1	3,74	2,89
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,23	0,00	3,40	3,71	6,36	20,89	0,46	17	1,02	0,81
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,32	23	0,95	0,75
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,20	0,99	3,84	12,95	24,41	29,55	1,88	5	2,43	1,85
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	1,00	3,84	7,41	10,81	21,59	1,35	8	1,55	1,19
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	2,41	2,93	1,04	6,53	0,40	20	0,54	0,41
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,24	2,19	5,00	0,30	24	0,46	0,34

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE



## Taxas de mortalidade por câncer de estômago, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	8,65	21,23	43,02	47,16	39,31	4,27	19	7,93	6,02	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,76	1,60	9,67	13,86	21,42	42,65	2,04	25	3,22	2,51	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,28	10,22	29,29	90,02	199,35	281,42	8,13	9	19,57	15,26	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,13	0,27	2,05	9,26	28,01	58,08	81,57	96,16	5,42	15	11,41	8,75	
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,03	0,22	1,04	3,74	12,77	25,72	45,41	63,30	3,83	21	5,56	4,31	
Ceará	0,05	0,00	0,10	0,00	0,36	2,13	6,51	20,86	39,05	70,73	100,08	6,56	11	8,84	6,90	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	1,30	8,36	20,71	67,87	148,79	232,78	6,70	10	14,62	11,35	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,13	0,32	2,10	8,85	31,48	80,67	145,11	229,99	11,15	6	16,51	12,74	
Goiás	0,00	0,00	0,08	0,24	0,23	1,37	6,57	18,28	45,06	85,87	126,55	6,25	13	9,66	7,50	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	0,90	2,53	7,34	15,54	17,06	24,26	1,89	26	2,95	2,29	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,33	7,59	20,85	52,73	105,14	206,95	6,53	12	11,92	9,32	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,19	0,23	1,62	7,99	27,85	49,49	114,10	155,11	8,26	8	12,15	9,46	
Minas Gerais	0,02	0,02	0,02	0,07	0,30	1,68	7,08	24,10	61,00	116,76	168,62	9,49	7	12,74	9,84	
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,90	8,83	21,44	45,74	82,62	79,33	5,22	17	9,77	7,57	
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,81	3,41	6,16	15,70	22,18	32,69	2,58	23	3,19	2,49	
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,17	0,25	2,07	10,79	33,73	85,32	168,82	235,23	12,80	2	18,02	13,91	
Pernambuco	0,00	0,00	0,05	0,14	0,22	1,16	5,32	12,39	26,43	54,86	62,37	4,51	18	6,06	4,73	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,64	2,98	4,58	8,73	22,17	9,08	1,62	27	2,29	1,82	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	2,07	8,56	26,84	68,53	126,41	192,26	11,94	3	14,25	11,03	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,42	0,27	0,59	4,86	20,12	31,99	60,69	81,96	5,72	14	7,43	5,74	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,09	0,36	1,62	7,88	27,37	65,09	136,18	175,26	11,59	5	14,06	10,86	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,64	7,05	21,57	37,01	102,81	212,93	5,24	16	10,75	8,51	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	23,16	49,83	41,57	257,67	4,12	20	10,19	7,95	
Santa Catarina	0,08	0,00	0,00	0,16	0,45	2,21	11,81	34,24	84,89	141,44	226,22	11,74	4	17,31	13,37	
São Paulo	0,01	0,01	0,00	0,06	0,37	2,25	9,63	32,66	87,93	169,25	269,50	13,41	1	18,36	14,20	
Sergipe	0,00	0,20	0,00	0,21	0,14	0,96	1,98	11,32	19,95	35,82	24,68	2,79	22	4,15	3,19	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,58	3,28	6,10	15,40	34,43	42,09	2,38	24	3,58	2,80	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de estômago, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,99	2,04	12,12	8,58	41,95	38,84	2,16	21	3,90	3,17	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,92	2,44	3,95	7,37	21,76	17,41	1,56	24	2,14	1,72	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,81	0,53	0,79	5,53	15,03	52,17	59,98	94,64	4,01	8	8,67	6,60	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,13	0,45	1,29	6,34	9,49	21,10	62,55	64,77	2,97	16	5,85	4,66	
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,87	2,22	5,26	10,88	23,32	43,08	2,24	20	2,76	2,20	
Ceará	0,10	0,00	0,00	0,00	0,37	1,40	5,19	8,77	19,90	36,95	50,27	3,90	9	4,66	3,69	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,20	0,00	0,29	1,76	2,65	11,25	23,19	45,32	78,59	3,11	13	5,38	4,25	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,33	3,86	8,96	21,42	60,22	83,98	4,43	7	5,59	4,42	
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	1,15	3,58	8,85	20,12	31,00	64,66	3,08	14	4,41	3,48	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	0,57	0,45	3,68	6,78	5,18	13,65	0,83	27	1,25	0,97	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,15	0,00	0,28	1,06	4,20	6,69	20,00	42,59	64,18	2,46	18	4,61	3,65	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,78	2,76	11,32	22,25	48,98	111,86	3,88	10	5,66	4,48	
Minas Gerais	0,03	0,00	0,07	0,07	0,24	1,16	3,43	9,48	21,71	48,83	94,61	4,87	6	5,39	4,27	
Pará	0,00	0,00	0,05	0,18	0,20	1,77	4,44	9,62	19,44	43,39	80,87	3,06	15	5,14	4,12	
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,55	2,81	5,70	10,67	10,65	16,42	1,92	22	2,17	1,69	
Paraná	0,00	0,00	0,04	0,09	0,26	1,65	4,72	13,01	30,89	66,96	125,74	5,88	4	7,42	5,86	
Pernambuco	0,05	0,00	0,00	0,05	0,29	1,36	2,44	6,38	13,49	21,14	39,27	2,64	17	3,06	2,44	
Piauí	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,46	0,95	1,85	3,41	14,58	16,11	0,93	26	1,18	0,96	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,58	4,74	11,09	26,18	48,85	108,02	6,75	1	6,20	4,93	
Rio Grande do Norte	0,29	0,00	0,00	0,00	0,17	1,08	2,69	9,05	17,59	24,62	41,17	3,18	12	3,71	2,90	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,04	0,43	1,01	3,99	9,44	22,73	50,05	100,96	6,04	3	5,63	4,46	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,82	1,51	8,83	28,42	35,00	114,89	2,40	19	5,44	4,29	
Roraima	1,11	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	4,11	8,27	44,65	94,65	154,36	3,51	11	9,02	6,99	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50	1,61	5,11	12,23	22,10	61,02	103,43	5,28	5	6,41	5,13	
São Paulo	0,00	0,00	0,01	0,11	0,28	1,60	4,19	11,06	27,11	63,01	136,43	6,32	2	6,90	5,50	
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	2,89	4,41	5,86	14,56	34,83	1,66	23	1,98	1,59	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,65	1,39	11,20	17,49	20,02	1,24	25	1,99	1,54	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de fígado, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	3,33	5,77	13,07	20,24	37,73	91,72	3,56	5	5,88	4,83
Alagoas	0,12	0,00	0,00	0,00	0,44	0,89	2,14	7,18	16,09	12,69	21,33	1,75	21	2,81	2,17
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2,55	9,01	21,43	62,95	86,59	2,18	17	5,46	4,28
Amazonas	0,00	0,00	0,12	0,13	0,63	2,43	6,84	14,35	20,15	40,16	40,07	2,94	10	5,55	4,45
Bahia	0,09	0,03	0,07	0,10	0,17	0,40	1,96	5,37	10,17	16,22	24,18	1,58	23	2,26	1,77
Ceará	0,14	0,00	0,05	0,00	0,22	0,47	2,57	4,50	11,76	16,78	23,95	1,76	20	2,39	1,87
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,01	4,07	12,43	20,05	54,49	95,85	2,94	11	5,85	4,66
Espírito Santo	0,28	0,00	0,00	0,26	0,24	1,19	2,60	8,83	22,15	39,84	43,51	3,13	9	4,53	3,52
Goiás	0,08	0,08	0,00	0,00	0,23	0,63	2,83	9,14	17,89	44,40	52,47	2,88	12	4,40	3,43
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	0,76	1,97	4,15	6,95	8,34	16,87	1,08	27	1,64	1,32
Mato Grosso	0,15	0,00	0,15	0,16	0,18	1,00	3,37	8,45	19,40	37,04	62,48	2,57	16	4,45	3,51
Mato Grosso do Sul	0,19	0,00	0,00	0,00	0,57	0,81	2,92	9,28	15,34	31,12	45,62	2,71	14	3,86	3,05
Minas Gerais	0,15	0,09	0,09	0,13	0,22	0,75	2,50	7,86	17,26	30,13	45,03	2,83	13	3,74	2,92
Pará	0,11	0,11	0,05	0,00	0,32	1,06	1,80	4,82	11,88	22,26	33,05	1,51	24	269	2,14
Paraíba	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,31	1,42	2,78	6,85	9,28	17,83	1,17	26	1,42	1,11
Paraná	0,26	0,13	0,12	0,04	0,17	0,79	3,04	10,91	21,98	43,58	67,31	3,64	4	5,05	3,94
Pernambuco	0,21	0,05	0,00	0,05	0,28	1,37	3,44	9,22	20,72	35,68	43,91	3,30	8	4,45	3,48
Piauí	0,00	0,00	0,11	0,00	0,19	0,51	2,11	5,09	6,07	18,70	7,26	1,31	25	1,87	1,48
Rio de Janeiro	0,17	0,03	0,00	0,19	0,21	0,74	2,63	8,43	21,39	40,87	62,97	3,87	2	4,59	3,58
Rio Grande do Norte	0,14	0,13	0,00	0,00	0,09	0,71	1,98	8,47	7,60	24,62	24,59	2,10	19	2,65	2,10
Rio Grande do Sul	0,05	0,04	0,08	0,09	0,18	0,51	3,17	10,56	26,48	44,26	66,28	4,36	1	5,29	4,07
Rondônia	0,00	0,00	0,50	0,00	0,17	1,27	3,02	7,95	26,57	45,69	40,56	2,59	15	4,94	3,82
Roraima	0,00	0,00	1,22	1,39	0,84	0,00	4,98	26,47	12,46	69,28	51,53	3,36	7	6,82	5,46
Santa Catarina	0,08	0,00	0,00	0,16	0,32	0,83	2,76	9,10	31,45	38,43	55,14	3,54	6	5,23	3,98
São Paulo	0,15	0,01	0,09	0,14	0,22	0,78	2,95	10,66	24,50	44,03	66,46	3,84	3	5,18	4,02
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,57	3,11	7,70	16,99	17,29	27,43	2,15	18	3,16	2,43
Tocantins	0,29	0,00	0,00	0,00	0,58	3,69	3,05	7,70	22,95	31,57	1,62	22	2,36	1,90	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de fígado, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	4,65	4,08	1,73	17,16	23,97	12,95	2,02	13	3,40	2,88
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,23	1,79	7,65	12,16	23,16	25,32	1,93	16	2,76	2,12
Amapá	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	8,69	19,99	94,64	1,41	23	2,74	2,26
Amazonas	0,12	0,00	0,00	0,00	0,18	0,65	3,80	7,67	18,09	36,28	58,30	2,03	12	4,20	3,30
Bahia	0,09	0,00	0,07	0,00	0,16	0,26	1,82	4,18	10,51	16,12	16,49	1,55	21	2,05	1,58
Ceará	0,05	0,10	0,00	0,00	0,13	0,51	1,61	4,43	11,23	19,10	19,71	1,82	17	2,25	1,74
Distrito Federal	0,22	0,00	0,00	0,17	0,19	0,75	2,46	7,38	21,15	26,57	48,65	2,17	10	3,89	3,00
Espírito Santo	0,15	0,00	0,00	0,13	0,16	0,53	3,22	7,68	11,77	27,94	42,73	2,56	8	3,28	2,60
Goiás	0,09	0,09	0,00	0,08	0,18	0,55	2,08	6,27	15,52	20,83	38,27	2,01	15	3,03	2,35
Maranhão	0,06	0,00	0,00	0,06	0,09	0,83	1,17	3,68	6,57	8,88	11,09	0,97	27	1,44	1,14
Mato Grosso	0,32	0,00	0,15	0,00	0,00	0,83	3,43	10,03	13,94	29,37	40,11	2,02	14	3,72	2,93
Mato Grosso do Sul	0,39	0,19	0,00	0,19	0,45	0,78	1,97	5,82	18,63	32,65	67,12	2,70	7	3,96	3,13
Minas Gerais	0,05	0,05	0,02	0,04	0,15	0,54	1,82	5,62	11,56	23,03	38,81	2,39	9	2,72	2,14
Pará	0,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,63	1,48	5,80	10,18	20,75	32,95	1,41	22	2,47	1,94
Paraíba	0,22	0,00	0,00	0,10	0,14	0,18	1,22	2,93	7,04	10,65	11,50	1,28	26	1,42	1,10
Paraná	0,13	0,00	0,00	0,26	0,14	0,52	2,03	6,78	17,91	32,82	52,66	2,89	4	3,74	2,91
Pernambuco	0,05	0,05	0,05	0,00	0,23	0,72	2,54	8,21	18,95	25,85	57,04	3,25	2	3,86	3,00
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,12	0,17	0,57	1,11	4,62	6,81	16,48	19,04	1,38	24	1,82	1,44
Rio de Janeiro	0,14	0,04	0,03	0,06	0,14	0,62	1,99	6,80	12,15	25,31	41,94	3,18	3	3,01	2,37
Rio Grande do Norte	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,79	3,85	8,96	17,28	27,06	1,64	19	1,91	1,48
Rio Grande do Sul	0,14	0,05	0,00	0,09	0,15	0,42	2,11	6,94	15,68	35,12	59,74	3,92	1	3,73	2,92
Rondônia	0,27	0,00	0,00	0,28	0,34	0,23	3,02	6,11	23,48	25,45	41,78	1,74	18	3,88	2,96
Roraima	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	4,11	12,40	7,44	31,55	0,00	1,62	20	3,19	2,51
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,93	2,48	7,57	13,99	27,71	43,40	2,72	6	3,38	2,67
São Paulo	0,16	0,00	0,01	0,12	0,13	0,55	2,19	5,75	15,18	27,51	47,56	2,88	5	3,26	2,55
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,53	2,37	6,81	9,37	22,88	21,77	2,06	11	2,58	2,04
Tocantins	0,00	0,00	0,29	0,00	0,22	0,89	3,10	4,16	8,96	15,31	10,01	1,36	25	2,10	1,68

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de laringe, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	5,06	4,72	0,00	0,40	24	0,79	0,57
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,89	1,11	8,49	12,69	11,63	0,84	0,84	21	1,36	1,04
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	12,86	31,48	21,65	0,79	0,79	22	2,26	1,69
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	3,02	5,25	11,85	23,84	32,05	1,31	1,31	14	2,76	2,16
Bahia	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	1,71	4,88	7,14	9,58	12,45	1,07	1,07	18	1,58	1,21
Ceará	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	1,29	4,01	8,56	9,59	15,35	1,15	1,15	16	1,60	1,22
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,43	2,14	9,41	12,34	31,44	47,92	1,71	1,71	9	3,46	2,71
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	2,73	7,25	17,52	21,34	45,58	2,26	2,26	8	3,34	2,56
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,40	1,91	4,77	11,93	14,64	23,15	1,44	1,44	13	2,22	1,71
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,83	3,07	4,93	2,11	0,29	0,29	26	0,48	0,35
Mato Grosso	0,00	0,15	0,00	0,00	0,09	0,33	2,36	5,92	14,43	19,12	3,90	1,47	1,47	12	2,51	1,89
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,54	3,51	11,45	18,81	17,63	27,37	2,55	2,55	6	3,65	2,79
Minas Gerais	0,05	0,00	0,00	0,02	0,03	0,24	2,96	8,21	14,88	20,59	23,63	2,26	2,26	7	3,03	2,31
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,98	1,74	6,50	10,88	13,22	0,64	0,64	23	1,22	0,94
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,56	2,58	5,42	7,26	6,94	0,86	0,86	20	1,10	0,84
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,38	3,73	11,72	23,92	28,56	28,34	3,16	3,16	4	4,37	3,30
Pernambuco	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,81	6,32	12,62	15,39	14,00	1,68	1,68	10	2,34	1,77
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1,53	3,04	3,46	10,89	0,39	0,39	25	0,58	0,45
Rio de Janeiro	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,44	4,33	14,36	28,99	34,98	37,78	4,52	4,52	3	5,34	4,03
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1,26	3,71	9,60	6,30	12,29	1,06	1,06	19	1,48	1,11
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,62	5,68	21,18	34,17	39,52	37,07	5,56	5,56	1	6,62	5,00
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,42	2,35	7,38	10,44	20,56	50,70	1,48	1,48	11	2,88	2,28
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	12,46	55,43	0,00	1,07	1,07	17	2,67	2,05
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,29	3,53	14,01	22,38	31,07	25,45	3,09	3,09	5	4,48	3,38
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,40	5,91	18,25	31,07	39,70	43,82	4,68	4,68	2	6,22	4,72
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,70	5,43	8,86	12,35	10,97	1,16	1,16	15	1,82	1,38
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	2,44	0,96	0,00	0,00	0,22	0,22	27	0,32	0,25

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de laringe, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00
Alagoas	0,00	0,12	0,00	0,00	0,08	0,23	0,49	0,99	1,11	0,70	1,58	0,24	0,24	14	0,31	0,26
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,42	1,10	1,21	3,75	12,95	0,25	0,25	12	0,49	0,40
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,34	0,39	0,66	1,83	2,66	0,18	0,18	16	0,22	0,18
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,18	0,77	1,59	3,15	2,46	0,28	0,28	9	0,33	0,25
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,57	1,05	0,68	7,81	0,00	0,27	0,27	10	0,46	0,37
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,26	1,07	1,81	3,73	13,26	0,41	0,41	6	0,51	0,41
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,82	1,31	3,39	3,96	0,24	0,24	13	0,35	0,28
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,26	0,41	0,74	0,85	0,07	0,07	25	0,10	0,08
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,21	0,00	0,00	0,07	0,07	24	0,15	0,10
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,29	4,14	3,27	8,39	0,42	0,42	5	0,64	0,48
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,41	1,17	1,41	4,08	4,41	0,38	0,38	8	0,43	0,33
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,09	0,42	0,23	3,30	5,99	0,15	0,15	18	0,24	0,20
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,12	0,16	0,23	1,06	1,64	0,12	0,12	21	0,10	0,09
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,62	1,65	4,20	5,47	3,22	0,55	0,55	4	0,72	0,54
Pernambuco	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,66	1,07	2,83	2,81	0,26	0,26	11	0,31	0,24
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,68	1,27	1,46	0,09	0,09	22	0,12	0,09
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,42	1,37	3,08	4,13	6,99	0,62	0,62	1	0,59	0,45
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,66	0,52	2,35	0,12	0,12	19	0,15	0,11
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	1,88	3,10	4,66	4,48	0,62	0,62	2	0,61	0,46
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,68	2,47	0,00	10,44	0,20	0,20	15	0,43	0,34
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	17	0,37	0,28
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,28	1,98	1,73	4,95	2,77	0,41	0,41	7	0,52	0,39
São Paulo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,40	1,45	3,11	4,97	7,12	0,56	0,56	3	0,63	0,48
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,59	1,04	0,00	0,12	0,12	20	0,11	0,10
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	23	0,16	0,10

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por leucemias, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	2,34	1,79	2,37	1,95	0,91	1,33	1,92	3,27	2,53	9,43	0,00	1,98	15	2,14	2,02	
Alagoas	0,96	1,10	1,65	1,16	1,14	1,77	1,60	1,93	3,13	10,31	3,88	1,65	19	1,81	1,71	
Amapá	3,50	1,49	1,50	0,85	1,60	0,76	1,28	4,51	8,57	10,49	21,65	2,08	14	2,82	2,44	
Amazonas	1,05	1,99	0,86	1,34	0,63	2,31	1,81	2,45	4,74	5,02	16,03	1,62	20	1,98	1,85	
Bahia	0,70	1,06	0,70	0,88	1,05	1,24	1,57	2,09	4,12	7,52	10,67	1,43	22	1,65	1,49	
Ceará	2,25	1,38	1,28	1,27	1,15	1,37	2,24	3,04	5,37	10,07	14,12	2,12	13	2,35	2,11	
Distrito Federal	1,69	1,08	2,42	3,12	2,04	2,89	3,00	6,40	9,25	31,44	34,23	3,18	6	4,35	3,91	
Espírito Santo	1,57	1,32	1,60	2,94	1,74	2,65	2,34	3,62	8,27	19,21	31,08	2,94	9	3,40	3,10	
Goiás	1,09	1,81	1,42	1,36	1,18	1,83	2,83	3,05	8,83	14,64	30,87	2,42	11	2,95	2,62	
Maranhão	0,78	0,67	0,80	0,99	0,76	0,97	1,22	1,25	3,07	3,41	0,00	1,02	25	1,13	1,05	
Mato Grosso	1,37	1,35	1,17	1,40	0,64	2,11	0,67	5,07	4,48	11,95	39,05	1,91	17	2,48	2,25	
Mato Grosso do Sul	3,20	2,20	1,96	2,11	1,95	2,03	2,92	2,78	6,93	19,71	30,41	3,04	7	3,51	3,20	
Minas Gerais	1,22	1,59	1,33	1,74	1,48	1,70	2,70	3,64	8,09	17,16	38,96	2,73	10	3,14	2,80	
Pará	1,21	1,62	0,96	1,55	1,15	1,06	2,04	1,88	4,71	5,94	9,25	1,57	21	1,86	1,71	
Paraíba	1,10	1,04	1,07	1,26	1,41	1,93	1,56	3,18	4,28	4,44	8,92	1,79	18	1,90	1,77	
Paraná	1,59	1,73	1,68	2,05	1,78	1,75	3,08	5,58	12,01	24,33	36,13	3,33	5	4,00	3,48	
Pernambuco	1,39	1,20	1,22	1,52	1,22	1,71	2,42	4,66	5,05	10,26	12,09	2,14	12	2,42	2,19	
Piauí	0,53	0,83	0,55	0,72	0,46	1,28	1,76	2,29	3,04	6,23	9,08	1,22	24	1,40	1,26	
Rio de Janeiro	2,39	2,04	2,21	2,21	1,83	2,20	3,00	4,81	11,57	23,69	40,72	3,78	2	4,17	3,69	
Rio Grande do Norte	2,65	1,06	1,54	2,81	1,54	1,18	2,16	4,50	10,80	13,17	30,05	3,01	8	3,32	2,91	
Rio Grande do Sul	1,78	2,88	2,33	2,19	1,76	2,19	2,87	5,78	14,19	31,21	55,61	4,28	1	4,80	4,21	
Rondônia	2,05	1,01	1,00	1,36	0,85	0,42	1,01	1,14	5,69	6,85	10,14	1,33	23	1,68	1,48	
Roraima	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	3,31	0,00	0,00	51,53	0,76	27	1,21	1,14	
Santa Catarina	1,88	2,23	1,57	2,17	1,41	2,11	2,69	6,82	15,24	26,57	25,45	3,48	4	4,32	3,70	
São Paulo	1,81	1,93	1,66	2,25	1,70	1,83	3,02	6,07	10,94	25,56	45,65	3,50	3	4,15	3,64	
Sergipe	1,86	2,02	0,97	1,05	0,96	0,76	0,85	4,98	8,13	6,18	8,23	1,98	16	2,24	1,92	
Tocantins	0,29	0,29	1,12	0,31	0,84	0,29	1,23	1,83	0,00	3,83	15,78	0,83	26	0,95	0,90	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por leucemias, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,59	1,23	0,00	0,65	0,91	1,99	3,06	6,93	2,86	0,00	0,00	1,38	19	1,83	1,64	
Alagoas	1,34	0,37	1,06	1,39	0,82	0,92	2,28	1,97	1,84	6,32	6,33	1,34	21	1,49	1,39	
Amapá	4,34	3,08	0,00	3,23	0,00	0,79	2,76	0,00	4,35	0,00	0,00	1,81	13	1,85	1,71	
Amazonas	1,54	1,14	1,00	1,07	1,08	1,29	2,75	3,65	3,01	13,76	0,00	1,62	16	2,09	1,88	
Bahia	0,66	0,56	0,71	0,50	0,73	1,37	1,48	1,92	3,58	5,24	11,43	1,26	22	1,40	1,27	
Ceará	1,43	1,17	0,77	0,78	0,86	0,89	1,43	1,87	3,30	6,30	4,93	1,39	18	1,48	1,34	
Distrito Federal	1,95	0,88	0,60	2,45	0,96	2,39	2,46	4,92	5,46	20,32	26,20	2,38	8	3,03	2,71	
Espírito Santo	0,74	0,96	1,26	1,68	0,86	1,41	3,61	3,84	8,15	13,66	13,26	2,31	9	2,65	2,32	
Goiás	1,22	0,68	1,29	1,43	1,06	1,48	2,83	3,68	5,03	11,63	30,35	2,09	11	2,48	2,23	
Maranhão	0,49	0,40	0,54	0,50	0,56	0,57	0,81	0,79	1,23	2,22	2,56	0,63	27	0,70	0,66	
Mato Grosso	1,90	0,78	0,61	1,91	1,03	1,65	1,91	3,01	7,27	7,34	16,04	1,77	14	2,29	2,03	
Mato Grosso do Sul	2,14	2,10	0,92	1,55	0,90	1,30	2,57	4,20	9,31	14,15	25,17	2,43	6	3,00	2,61	
Minas Gerais	1,23	1,01	0,88	1,23	1,07	1,56	1,99	3,87	7,83	12,60	27,48	2,41	7	2,59	2,26	
Pará	1,31	0,89	0,55	0,60	0,64	1,03	1,13	1,84	3,47	4,72	6,99	1,09	25	1,33	1,19	
Paraíba	1,12	0,53	1,19	1,04	1,30	1,27	1,95	1,95	2,95	4,26	5,75	1,52	17	1,55	1,46	
Paraná	2,01	1,18	0,89	1,43	1,51	1,29	2,54	4,52	8,32	18,11	23,64	2,63	5	3,04	2,64	
Pernambuco	1,05	0,73	1,37	1,23	0,90	1,21	2,07	3,67	4,50	8,49	11,69	1,84	12	1,99	1,79	
Piauí	0,27	0,49	0,45	0,24	0,34	1,26	1,11	1,15	5,11	3,17	8,79	0,96	26	1,13	0,99	
Rio de Janeiro	2,04	1,93	1,57	1,53	1,27	1,72	1,90	4,09	7,37	15,27	23,51	2,99	2	2,93	2,62	
Rio Grande do Norte	2,58	1,63	1,17	1,39	0,86	1,08	0,79	4,07	7,97	7,86	14,12	2,24	10	2,37	2,06	
Rio Grande do Sul	1,94	1,95	1,19	1,52	1,11	1,63	2,88	5,20	9,49	20,19	36,14	3,58	1	3,49	3,04	
Rondônia	0,80	1,58	0,52	0,84	0,52	1,14	2,27	2,72	4,94	12,73	10,44	1,34	20	1,94	1,70	
Roraima	1,11	2,47	1,24	0,00	0,88	1,18	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	1,14	24	1,15	1,12	
Santa Catarina	1,78	1,76	1,79	1,56	1,33	1,22	2,41	4,08	8,81	15,83	28,63	2,72	4	3,09	2,72	
São Paulo	1,70	1,12	1,37	1,40	1,34	1,57	2,56	4,86	9,11	16,32	30,25	2,93	3	3,14	2,74	
Sergipe	1,91	1,04	0,59	1,04	0,78	1,23	1,05	2,00	4,10	7,28	4,35	1,63	15	1,61	1,44	
Tocantins	2,13	0,91	0,29	0,00	0,43	1,19	2,65	1,39	5,60	0,00	10,01	1,25	23	1,52	1,32	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de mama, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,99	4,08	13,85	17,16	11,99	25,90	2,10	24	3,87	3,07
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,87	8,14	11,85	14,00	16,85	31,65	3,02	20	4,22	3,46
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	5,53	12,53	0,00	0,00	0,00	1,21	27	2,07	1,79
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,13	0,72	2,98	10,14	18,98	27,73	30,02	55,06	3,59	17	6,80	5,45
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,03	0,23	3,36	9,84	17,01	17,82	25,16	40,68	4,31	14	5,56	4,54
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	3,74	12,48	20,77	23,07	31,49	38,44	5,49	12	6,83	5,53
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	5,66	21,23	40,07	61,39	89,08	78,59	9,15	6	14,68	11,59
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	5,12	13,53	26,25	31,98	39,11	50,09	6,85	10	8,56	6,90
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	4,37	13,33	25,88	29,30	38,75	43,55	5,94	11	8,16	6,56
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,40	4,87	7,09	7,19	8,51	15,36	1,58	26	2,32	1,90
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	4,13	12,97	17,73	24,24	24,97	60,16	4,18	16	6,75	5,53
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,19	0,56	4,95	14,81	26,19	27,42	45,71	131,44	7,01	9	9,44	7,77
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,02	0,45	4,24	14,16	26,83	33,95	45,18	64,41	7,92	7	9,07	7,27
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	2,34	8,89	13,16	16,66	22,17	30,95	2,82	21	4,71	3,81
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,09	6,59	11,08	13,17	14,55	25,46	3,13	19	3,58	2,85
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	4,95	18,58	31,70	40,03	63,37	90,81	9,34	4	11,40	9,17
Pernambuco	0,00	0,00	0,05	0,05	0,67	5,15	15,75	25,88	30,94	40,76	64,05	7,59	8	8,98	7,31
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,83	6,20	10,16	9,20	10,14	8,79	2,16	23	2,93	2,38
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	6,96	25,75	50,14	65,15	95,75	151,87	18,36	1	17,51	13,99
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,02	11,55	21,50	21,58	30,38	36,47	5,33	13	6,51	5,24
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	6,65	22,85	43,70	58,78	78,24	143,67	15,92	2	15,48	12,40
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,14	9,07	11,55	13,59	12,73	20,89	2,16	22	3,89	3,13
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	8,22	24,81	44,65	15,78	51,45	3,57	18	7,90	6,17
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	5,03	19,58	32,84	36,61	57,39	84,96	9,30	5	11,15	9,01
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,66	6,47	21,37	44,93	60,18	85,67	135,88	14,05	3	15,63	12,46
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	4,04	8,94	17,64	19,34	22,88	45,72	4,31	15	5,66	4,63
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	3,54	11,78	12,32	13,12	10,01	2,04	25	3,09	2,46

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de pâncreas, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,96	1,63	10,12	9,43	13,10	0,79	24	1,46	1,10
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	1,25	3,32	7,15	7,93	0,00	0,80	22	1,26	0,97
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	2,25	17,15	52,46	43,30	1,49	13	3,87	2,99
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,38	1,41	4,20	11,85	10,04	28,05	0,94	17	2,02	1,55
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	1,07	2,68	6,98	10,17	16,00	0,92	18	1,35	1,04
Ceará	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,24	0,61	3,13	5,52	18,94	15,96	1,15	16	1,51	1,18
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,87	2,14	9,04	22,37	64,97	95,85	2,56	6	5,66	4,45
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,18	1,82	5,89	13,89	25,61	47,66	2,02	9	3,00	2,32
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,34	1,75	5,83	13,69	24,40	33,95	1,80	10	2,81	2,16
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	0,37	2,22	3,88	4,17	6,33	0,46	27	0,74	0,56
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,35	5,64	13,93	22,70	23,43	1,39	14	2,57	1,94
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2,14	5,57	15,84	31,12	51,70	2,25	8	3,37	2,61
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,32	1,84	6,89	15,50	28,95	41,52	2,42	7	3,26	2,51
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,82	2,81	6,50	13,85	10,58	0,71	26	1,36	1,04
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,57	2,58	5,71	6,05	6,94	0,78	25	1,00	0,77
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,67	2,92	8,59	23,05	41,04	69,43	3,37	4	4,75	3,68
Pernambuco	0,05	0,00	0,00	0,05	0,03	0,43	2,05	5,01	11,42	18,73	25,46	1,76	11	2,38	1,84
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	1,76	3,57	5,31	9,70	9,08	0,89	21	1,32	1,02
Rio de Janeiro	0,03	0,00	0,00	0,03	0,16	0,53	2,83	9,09	20,65	39,15	52,89	3,69	3	4,40	3,40
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,24	0,90	4,77	7,60	13,74	17,76	1,31	15	1,70	1,31
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,46	3,57	13,42	30,45	62,24	85,38	5,39	1	6,57	5,06
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,01	4,54	5,69	20,56	0,00	0,89	20	1,62	1,26
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,11	3,32	3,31	6,23	69,28	0,00	1,68	12	3,48	2,82
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,39	2,90	10,18	23,34	45,37	48,07	3,25	5	4,81	3,68
São Paulo	0,00	0,00	0,01	0,02	0,12	0,61	3,06	10,75	23,84	47,01	66,64	3,81	2	5,17	4,00
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,19	1,13	1,81	5,17	12,35	16,46	0,91	19	1,24	0,98
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,44	0,96	13,39	26,31	0,79	23	1,20	0,99

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de pâncreas, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais			Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	5,20	8,58	23,97	38,84	1,13	13	2,26	1,77
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1,23	4,05	4,21	12,66	0,47	25	0,69	0,52
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	4,15	0,00	4,35	0,00	15,77	0,60	22	1,03	0,87
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,83	6,63	7,51	25,91	0,52	24	1,16	0,89
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,12	0,81	3,44	5,26	9,56	17,28	0,98	16	1,26	0,98
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,13	0,60	2,21	5,74	12,39	14,29	1,00	15	1,21	0,93
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	1,90	7,38	20,46	43,76	67,36	2,34	6	4,42	3,43
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,90	3,41	9,05	18,63	38,31	1,54	10	2,01	1,57
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,08	3,54	12,68	21,32	36,95	1,49	11	2,37	1,81
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27	1,18	3,90	5,18	5,12	0,39	27	0,63	0,47
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,57	3,68	6,06	17,62	20,05	0,77	19	1,57	1,21
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,18	4,85	10,87	30,47	44,74	1,82	8	2,75	2,15
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,21	1,16	4,29	10,79	22,59	38,18	2,09	7	2,37	1,84
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,78	2,26	6,71	9,90	10,98	0,64	21	1,19	0,90
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,24	1,30	2,27	2,84	8,21	0,45	26	0,48	0,37
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	1,83	5,37	15,63	35,27	57,50	2,68	5	3,49	2,71
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,26	1,30	3,96	8,78	17,36	30,39	1,70	9	1,99	1,55
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,85	5,11	8,24	11,72	0,70	20	0,96	0,73
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,36	1,46	4,63	14,39	34,08	59,09	3,52	2	3,26	2,55
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,22	0,63	3,40	5,31	15,71	24,70	1,37	12	1,51	1,19
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,52	1,76	7,37	20,63	48,38	79,75	4,90	1	4,63	3,60
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	2,04	9,88	22,27	20,89	0,82	17	1,98	1,52
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	8,27	0,00	31,55	0,00	0,81	18	1,94	1,53
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,77	7,45	15,71	34,30	57,26	2,88	4	3,64	2,83
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,39	1,56	6,22	16,61	39,52	64,33	3,35	3	3,80	2,95
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1,05	4,41	8,20	10,40	6,53	1,09	14	1,50	1,12
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	6,72	4,37	20,02	0,57	23	0,99	0,74

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de próstata, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas											Taxa	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Bruta (*)		Pop. Mundial(1)	Pop. Brasileira(2)
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	3,27	27,83	94,33	196,54	3,96	19	7,27	5,76
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,71	3,32	14,75	61,87	122,15	2,95	24	4,51	3,60
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	6,76	30,01	73,45	238,13	2,88	25	7,45	5,92
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,01	6,30	26,67	92,86	264,43	3,39	21	8,00	6,43
Bahia	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,13	0,43	5,10	32,27	94,22	194,87	5,42	15	7,57	5,94
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,54	5,29	29,76	94,94	269,54	6,62	12	8,20	6,57
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,43	7,91	71,73	324,83	629,86	8,12	7	21,84	17,43
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	6,57	37,03	147,96	350,17	7,35	10	11,20	8,97
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23	0,67	7,29	37,55	154,18	391,99	7,04	11	11,94	9,62
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,28	0,75	2,22	12,47	34,13	80,15	1,96	27	3,03	2,40
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,51	5,92	33,83	151,73	406,10	5,51	14	11,59	9,38
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,97	6,50	57,91	146,26	450,14	8,79	5	13,66	10,86
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,62	6,34	34,21	140,25	360,23	7,95	8	10,87	8,75
Pará	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,06	0,41	3,62	22,42	79,16	166,58	2,96	23	6,01	4,77
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,57	2,78	13,98	34,69	73,32	2,87	26	3,08	2,41
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,06	0,81	7,15	49,39	186,80	469,75	9,69	4	14,51	11,64
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,79	6,76	39,32	121,98	290,84	7,75	9	10,04	7,95
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	3,57	24,29	76,89	119,80	3,90	20	5,57	4,33
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,89	8,93	56,56	204,10	572,17	13,23	2	16,72	13,45
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,72	2,91	27,59	88,74	198,06	6,08	13	6,93	5,49
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,83	8,48	57,56	219,12	590,37	13,62	1	17,39	14,00
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	6,24	25,62	141,65	375,16	4,38	18	10,48	8,54
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	31,14	235,56	515,33	5,04	17	14,60	11,96
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	5,63	40,13	177,00	446,79	8,15	6	13,15	10,61
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,56	8,20	49,99	200,93	562,37	10,93	3	15,96	12,89
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	8,60	29,55	95,10	159,08	5,09	16	7,46	5,82
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,83	21,18	74,59	121,01	3,21	22	5,14	4,03

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de pulmão, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	2,66	1,92	17,96	45,55	117,91	65,51	5,30	17	9,69	7,48	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	0,63	2,14	8,01	21,90	37,28	40,72	2,57	26	4,16	3,19	
Amapá	0,70	0,00	0,00	0,00	0,53	3,04	5,11	29,29	98,60	167,88	303,07	7,54	11	18,75	14,47	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,54	0,36	1,28	7,85	28,01	87,13	145,57	180,30	7,26	12	15,99	12,18	
Bahia	0,00	0,00	0,02	0,03	0,22	0,93	4,59	14,06	32,94	57,21	51,56	4,38	22	6,51	4,98	
Ceará	0,00	0,05	0,10	0,26	0,36	0,95	5,90	17,82	36,87	46,51	45,43	4,96	19	6,95	5,31	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,01	6,64	30,50	120,31	194,90	314,93	9,32	8	21,17	16,09	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,38	0,32	1,28	6,38	35,11	78,02	146,54	126,39	10,24	6	15,28	11,59	
Goias	0,00	0,00	0,08	0,08	0,18	0,91	6,66	30,08	73,55	126,86	157,41	8,92	9	14,19	10,79	
Maranhão	0,00	0,11	0,00	0,25	0,19	0,62	2,72	8,03	16,36	26,17	31,64	2,20	27	3,43	2,66	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,33	6,24	26,77	62,19	107,53	105,43	6,73	15	12,10	9,23	
Mato Grosso do Sul	0,19	0,00	0,00	0,00	0,46	1,22	7,40	31,87	82,65	119,29	130,78	9,74	7	14,67	11,08	
Minas Gerais	0,05	0,05	0,06	0,20	0,42	0,81	6,11	22,06	65,25	111,30	126,46	8,88	10	12,09	9,19	
Pará	0,05	0,00	0,05	0,12	0,28	0,61	4,33	19,16	46,86	86,58	71,39	4,59	21	8,98	6,80	
Paraíba	0,00	0,00	0,10	0,10	0,15	0,61	3,69	6,36	17,12	29,44	31,70	2,90	24	3,53	2,74	
Paraná	0,00	0,00	0,08	0,26	0,30	1,25	8,72	33,73	96,85	169,03	199,09	12,78	5	18,15	13,80	
Pernambuco	0,10	0,05	0,00	0,09	0,28	1,37	5,86	23,28	51,81	68,02	74,46	6,80	14	9,44	7,17	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,51	3,86	11,72	22,39	37,41	45,38	3,22	23	4,77	3,67	
Rio de Janeiro	0,03	0,00	0,00	0,16	0,32	1,63	13,85	52,67	139,22	229,75	246,42	21,48	2	25,77	19,51	
Rio Grande do Norte	0,14	0,13	0,00	0,28	0,09	0,59	6,30	17,21	37,98	52,10	46,44	5,26	18	7,13	5,41	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,09	0,64	2,16	16,63	83,45	224,85	365,48	342,65	32,62	1	40,01	30,07	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,27	0,51	0,85	6,37	26,68	63,58	93,67	131,81	6,07	16	11,95	9,10	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	6,65	29,78	80,98	193,99	206,13	7,02	13	17,30	13,26	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,08	0,32	1,57	11,03	55,19	154,92	238,32	190,88	17,57	3	26,44	19,77	
São Paulo	0,01	0,00	0,05	0,11	0,20	1,56	9,19	41,40	116,49	212,20	244,67	15,95	4	22,03	16,73	
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,63	0,82	0,57	3,68	16,30	36,94	59,28	38,40	4,59	20	6,91	5,26	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	9,15	21,18	47,81	36,83	2,81	25	4,50	3,42	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer de pulmão, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,66	1,02	13,85	37,19	41,95	51,79	3,07	15	6,14	4,71	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,72	1,79	5,92	9,95	11,23	28,48	1,71	24	2,34	1,91	
Amapá	0,00	0,00	0,00	1,62	1,05	3,95	1,38	15,03	30,43	69,98	78,87	3,62	12	7,32	5,90	
Amazonas	0,00	0,00	0,12	0,27	0,54	0,78	4,65	13,14	33,76	42,53	55,06	2,95	17	6,14	4,71	
Bahia	0,03	0,00	0,02	0,05	0,11	0,59	1,89	5,41	8,69	15,59	21,80	1,62	25	2,11	1,66	
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,68	3,58	9,71	18,56	22,25	23,66	2,86	18	3,65	2,81	
Distrito Federal	0,00	0,22	0,00	0,00	0,48	1,63	3,98	9,49	34,79	106,27	116,01	4,45	7	8,41	6,61	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,80	3,22	10,46	18,70	50,91	75,14	3,89	11	5,02	3,95	
Goias	0,00	0,09	0,08	0,16	0,18	0,60	4,75	12,26	30,38	63,95	85,77	4,40	8	6,74	5,22	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	0,19	1,80	2,89	8,01	6,29	11,94	0,89	27	1,39	1,07	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,16	0,19	0,71	5,15	13,71	29,69	44,06	52,14	3,06	16	5,90	4,53	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,18	0,00	0,23	0,26	6,52	17,14	37,77	63,12	100,67	5,28	6	7,95	6,12	
Minas Gerais	0,03	0,07	0,02	0,18	0,15	0,67	3,64	9,13	21,12	41,19	54,54	4,03	9	4,65	3,62	
Pará	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,68	2,70	7,07	15,97	33,48	36,94	1,98	21	3,55	2,76	
Paraíba	0,00	0,00	0,10	0,31	0,14	0,18	2,56	3,58	6,81	14,20	9,85	1,55	26	1,71	1,35	
Paraná	0,00	0,00	0,04	0,00	0,19	1,04	5,04	16,19	41,95	70,73	88,13	6,26	3	8,16	6,25	
Pernambuco	0,05	0,00	0,05	0,19	0,35	1,06	3,68	9,46	16,49	25,66	44,42	3,28	13	3,87	3,06	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	1,26	2,70	7,39	10,56	12,68	14,64	1,78	22	2,43	1,93	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25	1,24	6,38	17,40	34,67	57,03	72,86	7,69	2	7,39	5,72	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,76	3,32	7,24	12,28	20,95	25,88	2,43	19	2,93	2,30	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,04	0,28	1,53	8,15	27,46	53,77	78,12	96,78	10,86	1	10,76	8,24	
Rondônia	0,27	0,00	0,00	0,00	0,52	1,59	4,16	13,58	28,42	60,46	73,11	3,08	14	6,56	5,14	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	4,11	4,13	22,32	47,33	154,36	2,11	20	5,53	4,45	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,08	0,16	0,18	0,73	4,54	18,05	38,51	50,47	66,49	5,55	5	7,18	5,46	
São Paulo	0,04	0,01	0,01	0,04	0,18	1,02	4,51	14,12	33,41	58,16	82,74	6,02	4	6,88	5,31	
Sergipe	0,21	0,00	0,79	0,83	0,26	1,23	4,73	12,43	22,85	33,28	39,19	3,93	10	5,04	3,98	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	4,87	7,62	11,20	15,31	20,02	1,74	23	2,75	2,14	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE



## Taxas de mortalidade por câncer do tecido linfático, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,67	0,96	1,63	0,00	0,00	0,00	0,40	26	0,49	0,47	
Alagoas	0,60	0,73	0,24	0,64	0,53	0,63	1,42	2,49	7,60	5,55	7,76	1,16	16	1,56	1,29	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	8,57	10,49	21,65	0,60	23	1,30	1,03	
Amazonas	0,70	0,62	0,49	0,80	0,36	0,64	1,61	2,80	5,93	8,78	20,03	1,10	15	1,72	1,46	
Bahia	0,23	0,30	0,22	0,31	0,68	1,04	1,71	3,01	5,13	6,93	7,11	1,12	18	1,45	1,24	
Ceará	0,48	0,38	0,38	0,79	1,15	0,85	1,76	3,33	6,24	9,83	5,53	1,47	14	1,79	1,53	
Distrito Federal	0,21	0,65	0,40	1,17	1,50	1,59	3,86	6,78	22,37	41,91	75,31	2,96	3	5,31	4,35	
Espírito Santo	0,71	0,53	0,49	0,51	0,95	1,55	2,86	3,85	8,60	13,52	18,65	1,95	9	2,45	2,09	
Goiás	0,67	0,41	0,55	0,64	1,23	1,26	2,16	3,97	9,94	11,71	10,80	1,84	11	2,35	1,97	
Maranhão	0,00	0,00	0,05	0,12	0,33	0,69	0,75	1,11	3,88	3,79	2,11	0,51	27	0,75	0,62	
Mato Grosso	0,76	0,45	0,88	0,16	0,64	0,44	1,35	1,69	5,47	8,36	11,71	1,05	20	1,45	1,23	
Mato Grosso do Sul	0,38	1,83	0,53	1,34	1,03	0,41	1,95	4,95	11,88	14,52	30,41	2,19	7	2,86	2,39	
Minas Gerais	0,39	0,48	0,52	0,77	0,84	1,14	1,95	3,91	8,81	14,15	16,29	1,87	10	2,27	1,91	
Pará	0,42	0,32	0,16	0,30	0,67	0,50	0,90	1,61	3,81	2,47	6,61	0,69	24	0,95	0,82	
Paraíba	0,22	0,21	0,58	0,21	0,22	0,20	1,28	1,19	2,00	3,23	0,99	0,62	25	0,69	0,59	
Paraná	0,43	0,80	0,70	0,90	0,96	1,19	2,88	5,33	9,59	15,02	27,63	2,26	6	2,80	2,37	
Pernambuco	0,41	0,24	0,90	0,95	1,03	1,71	2,60	4,92	7,84	8,25	8,91	1,87	8	2,25	1,95	
Piauí	0,00	0,24	0,33	0,00	0,19	1,02	1,58	2,04	2,66	2,77	5,45	0,69	21	0,90	0,79	
Rio de Janeiro	0,56	0,68	0,67	0,85	1,22	1,80	3,00	6,47	11,63	22,46	39,04	3,14	2	3,50	2,96	
Rio Grande do Norte	0,56	0,27	0,64	0,56	0,63	0,71	1,62	2,38	6,40	9,73	9,56	1,37	13	1,63	1,38	
Rio Grande do Sul	0,36	0,57	0,33	1,01	0,99	1,77	2,90	8,48	15,46	24,59	31,46	3,36	1	3,84	3,15	
Rondônia	0,51	0,76	0,50	0,82	0,51	1,06	1,34	3,41	4,74	2,28	10,14	1,08	19	1,43	1,26	
Roraima	2,17	0,00	0,00	1,39	1,68	1,11	0,00	3,31	18,69	13,86	0,00	1,68	12	2,81	2,23	
Santa Catarina	0,49	0,23	0,37	0,89	0,82	1,62	3,32	5,27	12,35	22,48	24,04	2,45	5	3,17	2,63	
São Paulo	0,35	0,68	0,55	1,04	1,46	1,85	2,97	6,57	13,54	23,56	31,22	2,99	4	3,62	3,04	
Sergipe	0,41	0,81	0,19	0,63	0,82	1,15	1,13	3,62	5,91	4,94	5,49	1,21	17	1,55	1,33	
Tocantins	0,29	0,29	0,00	0,92	0,21	0,58	0,41	0,61	7,70	3,83	10,52	0,79	22	1,11	0,91	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

## Taxas de mortalidade por câncer do tecido linfático, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	27	0,06	0,06	
Alagoas	0,00	0,25	0,00	0,25	0,16	0,57	0,98	1,97	2,21	6,32	6,33	0,66	17	0,85	0,71	
Amapá	0,72	0,77	0,00	0,00	0,00	0,79	2,76	2,51	0,00	0,00	15,77	0,74	18	0,97	0,88	
Amazonas	0,12	0,25	0,37	0,80	0,54	0,26	2,11	1,10	6,03	7,51	6,48	0,86	13	1,33	1,11	
Bahia	0,12	0,14	0,15	0,21	0,30	0,33	1,25	1,82	4,09	6,42	9,31	0,85	14	1,03	0,85	
Ceará	0,20	0,49	0,34	0,05	0,40	0,17	1,19	2,04	3,42	7,98	8,38	0,95	12	1,08	0,90	
Distrito Federal	0,22	0,00	0,00	0,87	0,67	1,51	2,27	3,51	12,96	26,57	41,17	2,00	4	3,10	2,54	
Espírito Santo	0,15	0,14	0,00	0,13	0,55	0,80	1,55	1,92	7,54	9,93	17,68	1,31	11	1,59	1,30	
Goiás	0,17	0,00	0,24	0,24	0,75	0,77	0,83	3,41	6,56	7,75	14,52	1,17	10	1,52	1,25	
Maranhão	0,00	0,11	0,00	0,19	0,23	0,32	0,45	1,18	1,03	4,07	1,71	0,36	23	0,47	0,41	
Mato Grosso	0,16	0,78	0,00	0,32	0,37	0,59	0,57	2,34	3,64	4,41	12,03	0,72	16	1,04	0,89	
Mato Grosso do Sul	0,19	0,19	0,74	0,19	0,90	0,65	1,97	3,56	7,76	8,71	8,39	1,39	9	1,79	1,49	
Minas Gerais	0,18	0,16	0,33	0,18	0,47	0,84	0,90	3,05	5,42	9,47	15,94	1,35	8	1,47	1,22	
Pará	0,16	0,22	0,16	0,18	0,24	0,29	1,39	1,13	2,55	4,24	9,98	0,57	20	0,82	0,70	
Paraíba	0,00	0,32	0,20	0,21	0,21	0,46	0,61	1,30	1,14	2,13	2,46	0,49	21	0,51	0,46	
Paraná	0,27	0,18	0,17	0,65	0,82	0,93	1,37	3,36	5,85	15,09	18,27	1,61	5	1,88	1,58	
Pernambuco	0,05	0,10	0,46	0,28	0,41	1,36	1,71	2,86	4,93	7,93	10,75	1,31	7	1,46	1,26	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,95	0,46	1,70	2,54	1,46	0,28	25	0,38	0,30	
Rio de Janeiro	0,25	0,18	0,23	0,60	0,74	0,98	2,12	3,99	9,25	17,97	21,82	2,53	1	2,38	1,96	
Rio Grande do Norte	0,43	0,41	0,39	0,42	0,35	0,11	0,32	2,94	3,32	4,71	2,35	0,82	19	0,93	0,77	
Rio Grande do Sul	0,28	0,23	0,13	0,63	0,58	0,77	2,11	3,81	7,91	19,83	27,18	2,46	2	2,33	1,92	
Rondônia	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,76	1,36	1,24	3,18	0,00	0,27	26	0,44	0,36	
Roraima	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	7,44	15,78	0,00	0,67	22	1,37	1,04	
Santa Catarina	0,17	0,16	0,23	0,66	0,60	0,93	1,70	3,03	7,94	10,88	12,93	1,55	6	1,81	1,50	
São Paulo	0,19	0,21	0,31	0,57	0,81	1,01	2,02	4,40	9,33	17,48	26,08	2,28	3	2,45	2,03	
Sergipe	0,64	0,21	0,00	0,62	0,52	0,53	0,53	0,80	2,93	3,12	4,35	0,70	15	0,78	0,68	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,44	0,00	2,24	4,37	0,00	0,35	24	0,48	0,43	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer de vesícula biliar, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, entre 1995 e 1999.**

Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	2,53	4,72	0,00	0,24	23	0,47	0,34	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,25	0,89	1,66	3,13	2,38	11,63	0,46	17	0,71	0,57	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	2,25	21,43	10,49	151,53	1,69	1	3,99	3,20	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,40	1,05	5,93	6,27	0,00	0,34	19	0,76	0,55	
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,50	1,29	2,94	6,64	12,45	0,51	16	0,71	0,56	
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,24	0,61	1,66	4,50	5,75	14,74	0,66	11	0,90	0,70	
Distrito Federal	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,43	1,88	7,71	23,05	41,08	0,80	8	1,91	1,50	
Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1,04	3,40	4,30	9,25	18,65	0,83	7	1,21	0,95	
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,67	2,12	4,64	9,76	12,35	0,66	12	1,03	0,79	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,19	0,55	1,23	4,17	1,05	0,19	26	0,30	0,23	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,41	2,49	4,78	7,81	0,29	20	0,54	0,41	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,86	3,96	10,37	21,29	0,65	13	0,99	0,77	
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,69	1,63	4,15	9,44	20,44	0,77	9	1,03	0,81	
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,49	1,47	2,47	6,43	5,29	0,35	18	0,64	0,50	
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,60	1,71	2,42	0,99	0,23	24	0,31	0,23	
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,53	2,13	7,07	13,54	14,88	0,94	5	1,33	1,02	
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,26	0,72	2,28	4,12	12,04	12,09	0,84	6	1,10	0,87	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,18	0,76	1,90	3,46	1,82	0,24	22	0,36	0,28	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,62	2,77	7,15	16,81	25,19	1,32	2	1,60	1,24	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,26	1,59	3,60	7,44	5,46	0,65	14	0,85	0,67	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,67	2,24	8,48	14,25	26,96	1,28	3	1,59	1,22	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,57	2,85	4,57	20,28	0,28	21	0,63	0,50	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,15	27	0,42	0,33	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,85	1,56	4,24	7,77	15,55	0,64	15	0,94	0,73	
São Paulo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,14	0,61	2,25	6,04	11,81	22,28	0,94	4	1,30	1,01	
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,36	2,95	6,18	24,68	0,67	10	0,86	0,69	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,61	0,00	3,83	10,52	0,22	25	0,31	0,27	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)

(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

**Taxas de mortalidade por câncer de vesícula biliar, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 1995 e 1999.**


Estados	Taxas Específicas												Taxa Bruta (*)	Classificação	Taxa Padronizada	
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Pop. Mundial(1)			Pop. Brasileira(2)	
Acre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	2,86	0,00	0,00	0,17	27	0,36	0,25	
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,98	2,47	6,63	7,02	15,82	0,82	19	1,19	0,90	
Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	7,52	13,04	10,00	78,87	1,58	11	3,18	2,52	
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,26	0,84	2,56	10,85	15,01	9,72	0,79	21	1,68	1,26	
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	1,11	3,93	8,84	14,15	23,40	1,39	14	1,79	1,37	
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,26	1,19	2,98	7,81	14,28	13,80	1,30	15	1,57	1,21	
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10	0,00	0,95	5,98	19,10	40,63	29,94	1,81	6	3,54	2,66	
Espírito Santo	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,03	4,69	10,26	21,73	26,52	1,68	8	2,21	1,69	
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,22	0,92	3,68	8,31	21,80	23,75	1,29	16	1,96	1,52	
Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,27	1,05	3,29	5,18	3,41	0,37	26	0,56	0,42	
Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,57	2,34	4,85	22,03	16,04	0,70	22	1,45	1,13	
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	4,53	14,49	19,59	11,19	1,47	13	2,29	1,69	
Minas Gerais	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,21	1,16	4,58	11,42	21,29	29,79	2,02	4	2,32	1,78	
Pará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	0,44	2,12	4,16	12,73	18,97	0,66	23	1,13	0,89	
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,65	4,77	5,68	9,03	0,65	24	0,71	0,53	
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	1,21	4,15	9,50	22,26	33,85	1,73	7	2,22	1,73	
Pernambuco	0,05	0,00	0,00	0,00	0,09	0,34	1,66	4,91	11,78	21,51	29,92	2,09	3	2,47	1,91	
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	2,08	6,13	11,41	8,79	0,80	20	1,12	0,84	
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,24	1,27	5,30	12,29	24,55	39,61	2,84	2	2,66	2,05	
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,27	5,43	7,63	17,28	20,00	1,64	10	1,91	1,47	
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,22	1,31	5,49	15,02	27,71	56,15	3,32	1	3,13	2,42	
Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,40	3,71	12,73	20,89	0,53	25	1,25	0,98	
Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	14,88	31,55	0,00	1,00	17	2,73	2,00	
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,92	4,66	10,19	20,45	20,32	1,64	9	2,08	1,59	
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,18	0,95	3,62	9,83	20,13	34,19	1,87	5	2,10	1,63	
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	4,01	12,89	14,56	19,59	1,56	12	2,09	1,56	
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,33	4,16	4,48	8,75	20,02	0,89	18	1,38	1,11	

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)


(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DAS TAXAS BRUTAS DE MORTALIDADE POR CÂNCER, POR 100.000 HOMENS E 100.000 MULHERES, NAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, ENTRE 1995 E 1999.


Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **neoplasia**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **neoplasia**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de boca**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.



Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de boca**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de cólon e reto**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.







Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de cólon e reto**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de encéfalo**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de encéfalo**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de esôfago**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de esôfago**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de estômago**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.



Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de estômago**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de fígado**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.







Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de fígado**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de laringe**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de laringe**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **leucemias**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **leucemias**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de mama**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.



Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer do colo do útero**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de pâncreas**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.







Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de pâncreas**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de traquéia, brônquios e pulmões**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de traquéia, brônquios e pulmões**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **tecido linfático**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **tecido linfático**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.




Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de vesícula biliar**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.



Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de vesícula biliar**, por 100.000 mulheres, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.



Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por **câncer de próstata**, por 100.000 homens, nas Unidades da Federação, entre 1995 e 1999.





**NÚMERO MÉDIO DE ANOS POTENCIAS DE VIDA  
PERDIDOS POR CÂNCER, POR 1.000 HABITANTES,  
1.000 HOMENS E 1.000 MULHERES,  
BRASIL, ENTRE 1995 E 1999.**

## Anos Potenciais de Vida Perdidos para tipos de câncer selecionados no Brasil entre 1995 e 1999.

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Todas as Neoplasias**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	198.253	3,09
5-9 anos	189.688	2,27
10-14 anos	171.983	1,94
15-19 anos	215.828	2,54
20-29 anos	444.150	3,17
30-39 anos	840.210	7,10
40-49 anos	1.428.050	16,80
50-59 anos	1.426.845	26,19
60-69 anos	667.125	18,29
<b>Total 1 - 69</b>	<b>5.582.131</b>	<b>7,38</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Todas as Neoplasias**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	224.884	3,50
5-9 anos	217.003	2,59
10-14 anos	198.902	2,24
15-19 anos	252.827	2,98
20-29 anos	532.980	3,80
30-39 anos	1.056.264	8,93
40-49 anos	1.942.148	22,84
50-59 anos	2.282.952	41,91
60-69 anos	1.867.950	51,21
70-79 anos	491.968	26,18
<b>Total 1 - 79</b>	<b>9.067.877</b>	<b>11,70</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Todas as Neoplasias**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	107.669	3,30
5-9 anos	108.688	2,56
10-14 anos	97.233	2,17
15-19 anos	128.468	3,02
20-29 anos	230.175	3,33
30-39 anos	344.050	5,98
40-49 anos	663.200	16,00
50-59 anos	769.125	29,28
60-69 anos	386.245	22,72
<b>Total 1 - 69</b>	<b>2.834.852</b>	<b>7,58</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Todas as Neoplasias**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	122.132	3,74
5-9 anos	124.339	2,93
10-14 anos	112.452	2,51
15-19 anos	150.491	3,54
20-29 anos	276.210	3,99
30-39 anos	432.520	7,52
40-49 anos	901.952	21,77
50-59 anos	1.230.600	46,85
60-69 anos	1.081.486	63,62
70-79 anos	283.540	33,47
<b>Total 1 - 79</b>	<b>4.715.721</b>	<b>12,33</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Todas as Neoplasias**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	90.383	2,86
5-9 anos	80.688	1,96
10-14 anos	74.693	1,70
15-19 anos	87.150	2,06
20-29 anos	213.615	3,00
30-39 anos	495.530	8,15
40-49 anos	764.150	17,53
50-59 anos	656.715	23,28
60-69 anos	280.345	14,39
<b>Total 1 - 69</b>	<b>2.743.268</b>	<b>7,18</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Todas as Neoplasias**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	102.524	3,24
5-9 anos	92.307	2,24
10-14 anos	86.384	1,97
15-19 anos	102.090	2,41
20-29 anos	256.338	3,61
30-39 anos	622.952	10,25
40-49 anos	1.039.244	23,85
50-59 anos	1.050.744	37,25
60-69 anos	784.966	40,30
70-79 anos	208.028	20,15
<b>Total 1 - 79</b>	<b>4.345.576</b>	<b>11,07</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

## Anos Potenciais de Vida Perdidos para tipos de câncer selecionados no Brasil entre 1995 e 1999.

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Boca**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	670	0,01
5-9 anos	625	0,01
10-14 anos	518	0,01
15-19 anos	998	0,01
20-29 anos	4.005	0,03
30-39 anos	17.045	0,14
40-49 anos	60.725	0,71
50-59 anos	58.545	1,07
60-69 anos	19.130	0,52
<b>Total 1 - 69</b>	<b>162.260</b>	<b>0,21</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Boca**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	760	0,01
5-9 anos	715	0,01
10-14 anos	599	0,01
15-19 anos	1.169	0,01
20-29 anos	4.806	0,03
30-39 anos	21.428	0,18
40-49 anos	82.586	0,97
50-59 anos	93.672	1,72
60-69 anos	53.564	1,47
70-79 anos	9.560	0,51
<b>Total 1 - 79</b>	<b>268.858</b>	<b>0,35</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Boca**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	67	0,00
5-9 anos	438	0,01
10-14 anos	403	0,01
15-19 anos	473	0,01
20-29 anos	2.160	0,03
30-39 anos	13.580	0,24
40-49 anos	53.350	1,29
50-59 anos	51.060	1,94
60-69 anos	15.785	0,93
<b>Total 1 - 69</b>	<b>137.315</b>	<b>0,37</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Boca**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	76	0,00
5-9 anos	501	0,01
10-14 anos	466	0,01
15-19 anos	554	0,01
20-29 anos	2.592	0,04
30-39 anos	17.072	0,30
40-49 anos	72.556	1,75
50-59 anos	81.696	3,11
60-69 anos	44.198	2,60
70-79 anos	6.880	0,81
<b>Total 1 - 79</b>	<b>226.590</b>	<b>0,59</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Boca**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	536	0,02
5-9 anos	188	0,00
10-14 anos	115	0,00
15-19 anos	525	0,01
20-29 anos	1.845	0,03
30-39 anos	3.430	0,06
40-49 anos	7.350	0,17
50-59 anos	7.440	0,26
60-69 anos	3.330	0,17
<b>Total 1 - 69</b>	<b>24.759</b>	<b>0,06</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Boca**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	608	0,02
5-9 anos	215	0,01
10-14 anos	133	0,00
15-19 anos	615	0,01
20-29 anos	2.214	0,03
30-39 anos	4.312	0,07
40-49 anos	9.996	0,23
50-59 anos	11.904	0,42
60-69 anos	9.324	0,48
70-79 anos	2.680	0,26
<b>Total 1 - 79</b>	<b>42.001</b>	<b>0,11</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

## Anos Potenciais de Vida Perdidos para tipos de câncer selecionados no Brasil entre 1995 e 1999.

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer de Estômago**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	603	0,01
5-9 anos	188	0,00
10-14 anos	805	0,01
15-19 anos	2.993	0,04
20-29 anos	18.585	0,13
30-39 anos	62.650	0,53
40-49 anos	120.625	1,42
50-59 anos	135.465	2,49
60-69 anos	72.155	1,98
<b>Total 1 - 69</b>	<b>414.068</b>	<b>0,55</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer de Estômago**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	684	0,01
5-9 anos	215	0,00
10-14 anos	931	0,01
15-19 anos	3.506	0,04
20-29 anos	22.302	0,16
30-39 anos	78.760	0,67
40-49 anos	164.050	1,93
50-59 anos	216.744	3,98
60-69 anos	202.034	5,54
70-79 anos	56.120	2,99
<b>Total 1 - 79</b>	<b>745.345</b>	<b>0,96</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer de Estômago**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	201	0,01
5-9 anos	250	0,01
10-14 anos	230	0,01
15-19 anos	1.733	0,04
20-29 anos	9.585	0,14
30-39 anos	34.685	0,60
40-49 anos	79.625	1,92
50-59 anos	95.955	3,65
60-69 anos	51.125	3,01
<b>Total 1 - 69</b>	<b>273.389</b>	<b>0,73</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer de Estômago**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	228	0,01
5-9 anos	286	0,01
10-14 anos	266	0,01
15-19 anos	2.030	0,05
20-29 anos	11.502	0,17
30-39 anos	43.604	0,76
40-49 anos	108.290	2,61
50-59 anos	153.528	5,85
60-69 anos	143.150	8,42
70-79 anos	37.328	4,41
<b>Total 1 - 79</b>	<b>500.212</b>	<b>1,31</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer de Estômago**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	402	0,01
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	518	0,01
15-19 anos	1.260	0,03
20-29 anos	8.955	0,13
30-39 anos	27.965	0,46
40-49 anos	40.900	0,94
50-59 anos	39.300	1,39
60-69 anos	20.945	1,08
<b>Total 1 - 69</b>	<b>140.245</b>	<b>0,37</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer de Estômago**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	456	0,01
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	599	0,01
15-19 anos	1.476	0,03
20-29 anos	10.746	0,15
30-39 anos	35.156	0,58
40-49 anos	55.624	1,28
50-59 anos	62.880	2,23
60-69 anos	58.646	3,01
70-79 anos	18.720	1,81
<b>Total 1 - 79</b>	<b>244.303</b>	<b>0,62</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

## Anos Potenciais de Vida Perdidos para tipos de câncer selecionados no Brasil entre 1995 e 1999.

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Próstata**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	0	0,00
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	115	0,00
15-19 anos	158	0,00
20-29 anos	810	0,01
30-39 anos	1.680	0,03
40-49 anos	6.850	0,17
50-59 anos	26.535	1,01
60-69 anos	35.290	2,08
<b>Total 1 - 69</b>	<b>71.438</b>	<b>0,19</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos

TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Próstata**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	0	0,00
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	133	0,00
15-19 anos	185	0,00
20-29 anos	972	0,01
30-39 anos	2.112	0,04
40-49 anos	9.316	0,22
50-59 anos	42.456	1,62
60-69 anos	98.812	5,81
70-79 anos	51.180	6,04
<b>Total 1 - 79</b>	<b>205.166</b>	<b>0,54</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos

TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Mama**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	0	0,00
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	58	0,00
15-19 anos	315	0,01
20-29 anos	16.155	0,23
30-39 anos	105.315	1,73
40-49 anos	184.950	4,24
50-59 anos	135.810	4,81
60-69 anos	40.425	2,08
<b>Total 1 - 69</b>	<b>483.028</b>	<b>1,26</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos

TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Mama**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	0	0,00
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	67	0,00
15-19 anos	369	0,01
20-29 anos	19.386	0,27
30-39 anos	132.396	2,18
40-49 anos	251.532	5,77
50-59 anos	217.296	7,70
60-69 anos	113.190	5,81
70-79 anos	23.892	2,31
<b>Total 1 - 79</b>	<b>758.128</b>	<b>1,93</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos

TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer do Colo do Útero**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	0	0,00
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	230	0,01
15-19 anos	420	0,01
20-29 anos	20.385	0,29
30-39 anos	73.920	1,22
40-49 anos	103.300	2,37
50-59 anos	62.070	2,20
60-69 anos	16.660	0,86
<b>Total 1 - 69</b>	<b>276.985</b>	<b>0,72</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos

TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer do Colo do Útero**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	0	0,00
5-9 anos	0	0,00
10-14 anos	266	0,01
15-19 anos	492	0,01
20-29 anos	24.462	0,34
30-39 anos	92.928	1,53
40-49 anos	140.488	3,22
50-59 anos	99.312	3,52
60-69 anos	46.648	2,40
70-79 anos	8.588	0,83
<b>Total 1 - 79</b>	<b>413.184</b>	<b>1,05</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos

TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

## Anos Potenciais de Vida Perdidos para tipos de câncer selecionados no Brasil entre 1995 e 1999.

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Traquéia, Brônquios e Pulmão**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	804	0,01
5-9 anos	875	0,01
10-14 anos	1.725	0,02
15-19 anos	5.618	0,07
20-29 anos	16.335	0,12
30-39 anos	45.325	0,38
40-49 anos	134.625	1,58
50-59 anos	191.445	3,51
60-69 anos	106.990	2,93
<b>Total 1 - 69</b>	<b>503.742</b>	<b>0,67</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 habitantes**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Traquéia, Brônquios e Pulmão**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	912	0,01
5-9 anos	1.001	0,01
10-14 anos	1.995	0,02
15-19 anos	6.581	0,08
20-29 anos	19.602	0,14
30-39 anos	56.980	0,48
40-49 anos	183.090	2,15
50-59 anos	306.312	5,62
60-69 anos	299.572	8,21
70-79 anos	70.408	3,75
<b>Total 1 - 79</b>	<b>946.453</b>	<b>1,22</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Traquéia, Brônquios e Pulmão**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	536	0,02
5-9 anos	438	0,01
10-14 anos	863	0,02
15-19 anos	3.308	0,08
20-29 anos	9.765	0,14
30-39 anos	25.375	0,44
40-49 anos	86.400	2,08
50-59 anos	136.650	5,20
60-69 anos	79.530	4,68
<b>Total 1 - 69</b>	<b>342.864</b>	<b>0,92</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 homens**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Traquéia, Brônquios e Pulmão**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	608	0,02
5-9 anos	501	0,01
10-14 anos	998	0,02
15-19 anos	3.875	0,09
20-29 anos	11.718	0,17
30-39 anos	31.900	0,55
40-49 anos	117.504	2,84
50-59 anos	218.640	8,32
60-69 anos	222.684	13,10
70-79 anos	51.204	6,04
<b>Total 1 - 79</b>	<b>659.631</b>	<b>1,73</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Traquéia, Brônquios e Pulmão**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **70 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	268	0,01
5-9 anos	375	0,01
10-14 anos	863	0,02
15-19 anos	2.310	0,05
20-29 anos	6.480	0,09
30-39 anos	19.915	0,33
40-49 anos	48.150	1,10
50-59 anos	54.450	1,93
60-69 anos	27.350	1,40
<b>Total 1 - 69</b>	<b>160.161</b>	<b>0,42</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

Número médio, por **1.000 mulheres**, de anos potenciais de vida perdidos por **Câncer da Traquéia, Brônquios e Pulmão**, Brasil, entre 1995 e 1999, partindo da premissa que o limite superior é de **80 anos**.

Faixa Etária	APVP	TAPVP
1-4 anos	304	0,01
5-9 anos	429	0,01
10-14 anos	998	0,02
15-19 anos	2.706	0,06
20-29 anos	7.776	0,11
30-39 anos	25.036	0,41
40-49 anos	65.484	1,50
50-59 anos	87.120	3,09
60-69 anos	76.580	3,93
70-79 anos	19.108	1,85
<b>Total 1 - 79</b>	<b>285.541</b>	<b>0,73</b>

APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos  
TAPVP - Taxas de Anos Potenciais de Vida Perdidos

**SÉRIE TEMPORAL DAS TAXAS DE MORTALIDADE, BRUTAS  
E AJUSTADAS POR IDADE PELAS POPULAÇÕES  
MUNDIAL E BRASILEIRA, PARA TOPOGRAFIAS  
SELECIONADAS, ENTRE 1979 E 1999**


## NEOPLASIAS MALIGNAS SELECIONADAS

Estômago  
Traquéia, brônquios e pulmão  
Mama  
Colo do útero  
Cólon e Reto  
Esôfago  
Fígado e vias biliares intrahepáticas  
Leucemias  
Pâncreas  
Tecido linfático  
Boca  
Laringe  
Vesícula Biliar  
Encéfalo  
Próstata


Todas as neoplasias malignas




# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BRASIL

Taxas de mortalidade por **câncer do encéfalo**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, Brasil, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do encéfalo**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, Brasil, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer da próstata**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, Brasil, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# BRASIL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# ACRE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ACRE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# ACRE



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ACRE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ACRE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ACRE



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# ACRE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# ALAGOAS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ALAGOAS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# ALAGOAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# AMAPÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAPÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAPÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAPÁ

**Taxas de mortalidade por **câncer do encéfalo**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Amapá, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por **câncer do encéfalo**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Amapá, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


**Taxas de mortalidade por **câncer da Próstata**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Amapá, entre 1979 e 1999.**



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# AMAZONAS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# AMAZONAS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# BAHIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BAHIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BAHIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BAHIA

**Taxas de mortalidade por leucemias, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado da Bahia, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por leucemias, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado da Bahia, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por câncer do pâncreas, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado da Bahia, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por câncer do pâncreas, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado da Bahia, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BAHIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BAHIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# BAHIA



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# BAHIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# CEARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# CEARÁ

**Taxas de mortalidade por *câncer de mama*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer do colo do útero*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer do cólon e reto*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer do cólon e reto*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# CEARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# CEARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# CEARÁ



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# CEARÁ

**Taxas de mortalidade por câncer de laringe, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por câncer de laringe, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por câncer de Vesícula Biliar e Vias Biliares Extrahepáticas, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por câncer de Vesícula Biliar e Vias Biliares Extrahepáticas, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Ceará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# CEARÁ



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# CEARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# DISTRITO FEDERAL

**Taxas de mortalidade por *câncer de laringe*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, Distrito Federal, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer de laringe*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, Distrito Federal, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer de Vesícula Biliar e Vias Biliares Extrahepáticas*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, Distrito Federal, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer de Vesícula Biliar e Vias Biliares Extrahepáticas*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, Distrito Federal, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## DISTRITO FEDERAL



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# DISTRITO FEDERAL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ESPÍRITO SANTO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# ESPÍRITO SANTO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# ESPÍRITO SANTO





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





# GOIÁS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# GOIÁS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# GOIÁS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# GOIÁS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# MARANHÃO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MARANHÃO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MARANHÃO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MARANHÃO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MARANHÃO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MARANHÃO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MARANHÃO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MARANHÃO





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





# MATO GROSSO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MATO GROSSO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# MATO GROSSO DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MATO GROSSO DO SUL



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MATO GROSSO DO SUL



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MATO GROSSO DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## MATO GROSSO DO SUL



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MATO GROSSO DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# MINAS GERAIS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# PARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PARÁ



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer de laringe*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Pará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de mortalidade por *câncer de laringe*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Pará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de Mortalidade por *câncer de Vesícula Biliar e Vias Biliares Extrahepáticas*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Pará, entre 1979 e 1999.**





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

**Taxas de Mortalidade por *câncer de Vesícula Biliar e Vias Biliares Extrahepáticas*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Pará, entre 1979 e 1999.**




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PARÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# PARAÍBA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PARAÍBA



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARAÍBA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARAÍBA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARAÍBA



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PARAÍBA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# PARANÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARANÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PARANÁ

Taxas de mortalidade por **câncer do esôfago**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




Taxas de mortalidade por **câncer do esôfago**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do fígado**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




Taxas de mortalidade por **câncer do fígado**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARANÁ

Taxas de mortalidade por **câncer do tecido linfático**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do tecido linfático**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer de boca**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer de boca**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Paraná, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARANÁ




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PARANÁ



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PARANÁ





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





# PERNAMBUCO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PERNAMBUCO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PERNAMBUCO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PERNAMBUCO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PERNAMBUCO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PERNAMBUCO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PERNAMBUCO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PERNAMBUCO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# PIAUI




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PIAUI




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
(2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# PIAUI




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# PIAUI




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Avaliação - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Avaliação - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO DE JANEIRO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# RIO DE JANEIRO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## RIO GRANDE DO NORTE



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# RIO GRANDE DO NORTE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## RIO GRANDE DO SUL



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# RIO GRANDE DO SUL




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# RONDÔNIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# Rondônia




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RONDÔNIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RONDÔNIA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# Rondônia




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RONDÔNIA



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RONDÔNIA

Taxas de mortalidade por *todas as neoplasias*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Rondônia, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


Taxas de mortalidade por *todas as neoplasias*, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Rondônia, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recotagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# RORAIMA



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# RORAIMA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Popacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SANTA CATARINA



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# SANTA CATARINA




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SÃO PAULO



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Recontagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# SÃO PAULO




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# SERGIPE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SERGIPE

Taxas de mortalidade por **câncer de mama**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do colo do útero**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do cólon e reto**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


Taxas de mortalidade por **câncer do cólon e reto**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# SERGIPE

Taxas de mortalidade por **câncer do esôfago**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




Taxas de mortalidade por **câncer do esôfago**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do fígado**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




Taxas de mortalidade por **câncer do fígado**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado de Sergipe, entre 1979 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SERGIPE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SERGIPE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# SERGIPE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


## SERGIPE



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# SERGIPE




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




# TOCANTINS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# TOCANTINS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# TOCANTINS

Taxas de mortalidade por **câncer do esôfago**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado do Tocantins, entre 1989 e 1999.




Taxas de mortalidade por **câncer do esôfago**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado do Tocantins, entre 1989 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

Taxas de mortalidade por **câncer do fígado**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 homens, estado de Tocantins, entre 1989 e 1999.




Taxas de mortalidade por **câncer do fígado**, brutas e ajustadas por idade pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, estado de Tocantins, entre 1989 e 1999.




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# TOCANTINS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS





(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# TOCANTINS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# TOCANTINS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS


# TOCANTINS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al.(1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS

# TOCANTINS



(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS




(1) População Padrão Mundial, modificada por Doll et al. (1966)  
 (2) População Padrão Brasileira - Contagem Populacional 1996 - IBGE  
 Fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/DATASUS/MS  
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
 Divisão de Epidemiologia e Vigilância - CONPREV/INCA/MS



**VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL ESTIMADA (EAPC),  
POR CÂNCER, PARA O SEXO MASCULINO E PARA O  
SEXO FEMININO, BRASIL, ENTRE 1979 E 1999.**

### Todas as Neoplasias


Varição Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

### Câncer da Boca


Varição Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer do Colo do Útero


### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil




\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer do Cólon e Reto


### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .




\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer do Estômago


### Variação Percentual Estimada Anual - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer do Fígado


### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

### Câncer da Laringe


#### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

### Leucemias


#### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer da Mama Feminina


### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil




\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer do Pâncreas


### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .




\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .



## Tecido Linfático


### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

## Câncer da Vesícula Biliar

### Variação Percentual Anual Estimada - Brasil



\* EAPC não significativo,  $p > 0,05$ .

# Bibliografia

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE CONTROLE DO CÂNCER – PRO-ONCO. **Registro de câncer: princípios e métodos**. Rio de Janeiro : Pro-Onco, 1995 (IARC Lyon, FR).

BOLETIM DO CENTRO BRASILEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS – CBCD, v. 17, n. 1, jan./ago, 1996.

CANADIAN CANCER SOCIETY = SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER.

Disponível em: <<http://www.cancer.ca>>. Acesso em: 19 nov. 2002.

EAST VIEW CARTOGRAPHIC. Disponível em: <<http://www.cartographic.com>>.

Acesso em: 19 nov. 2002.

GARDNER, J. W., SANBORN, J. S. Years of Potencial Life Lost (YPLL): what does it measure?

**Epidemiology**, v.1, n.4, p.322-329, 1990.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <[www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)>.

Acesso em: 19 nov. 2002.

National Cancer Institute. SEER. **Cancer Statistics Review: 1973-1994**. [S.l.:s.n.], [199-].

NATIONAL CANCER INSTITUTE. Disponível em: <<http://www3.cancer.gov>>.

Acesso em: 19 nov. 2002.

PEIXOTO, H. C. G., SOUZA, M. L. O. Indicador anos potenciais de vida perdidos e a ordenação das causas de morte em Santa Catarina, 1995. **Informe Epidemiológico do SUS**, v.8, n.1, p.17-25, p.27-34, 1999.

\_\_\_\_\_. O Indicador anos potenciais de vida perdidos e as transformações na estrutura da causas de morte em Santa Catarina no período de 1980 a 1995. **Informe Epidemiológico do SUS**, v.8, n.1, p.27-34, 1999.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br>>.

Acesso em: 19 nov. 2002.

ROMEDER, J. M., McWHINNIE, J. R. Anos de vida potencial perdidos entre las edades de 1 y 70 anos: un indicador de mortalidad prematura para la planificacion de la salud. In: Buck C. et al. (org.). **El Desafio de la Epidemiologia**. Washington: OPAS, 1988.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. Disponível em: <<http://www2.uca.es>>. Acesso em: 19 nov. 2002.

VASSALLO, JUAN A, BARRIOS, Enrique. **Atlas de mortalidad por câncer en el Uruguay**. Montevideo: Comisión Honoraria de Lucha Contra el Câncer, 1994.

WERNECK, G. L., REICHENHEIM, M. E. Novas técnicas: anos potenciais de vida perdidos. **Informe Epidemiológico do SUS**. p.91-94, out., 1992.

